

Foglio illustrativo: informazioni per il paziente

TIOCALMINA 1,2 g / 100 ml + 0,1 g / 100 ml sciroppo

potassio solfoguaiacolato + dropropizina

Legga attentamente questo foglio prima di prendere questo medicinale perché contiene importanti informazioni per lei.

Prenda questo medicinale sempre come esattamente descritto in questo foglio o come il medico o farmacista le ha detto di fare.

- Conservi questo foglio. Potrebbe aver bisogno di leggerlo di nuovo.
- Se desidera maggiori informazioni o consigli, si rivolga al farmacista.
- Se si manifesta uno qualsiasi degli effetti indesiderati, tra cui effetti non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista. Vedere paragrafo 4.
- Si rivolga al medico se non nota miglioramenti o se nota un peggioramento dei sintomi dopo un breve periodo di trattamento.

Contenuto di questo foglio:

1. Cos'è Tiocalmina e a cosa serve
2. Cosa deve sapere prima di prendere Tiocalmina
3. Come prendere Tiocalmina
4. Possibili effetti indesiderati
5. Come conservare Tiocalmina
6. Contenuto della confezione e altre informazioni

1. Cos'è Tiocalmina e a cosa serve

Tiocalmina contiene dropropizina e potassio solfoguaiacolato.

La dropropizina ha un'attività antitosse; il potassio solfoguaiacolato ha un'azione espettorante, facilita l'espulsione delle secrezioni bronchiali e tracheali e riduce la secrezione bronchiale e la tosse.

Tiocalmina si usa come sedativo della tosse, cioè per calmare la tosse di qualunque natura, tosse irritativa e tosse del fumatore.

Si rivolga al medico se non si sente meglio o se si sente peggio dopo un breve periodo di trattamento.

2. Cosa deve sapere prima di prendere Tiocalmina

Non prenda Tiocalmina

- se è allergico alla dropropizina, al potassio solfoguaiacolato o ad uno qualsiasi degli altri componenti di questo medicinale (elencati al paragrafo 6),
- se è in gravidanza o sta allattando al seno (vedere paragrafo 2. Gravidanza e allattamento),
- se soffre di diabete.

Avvertenze e precauzioni

Si rivolga al medico o al farmacista prima di prendere Tiocalmina.

A causa della presenza di etanolo (alcol), usi particolare cautela se uno dei seguenti casi la riguardano:

- soffre di una malattia del fegato;
- ha/ha avuto problemi di abuso di alcol;
- soffre di epilessia

Bambini e adolescenti

Tiocalmina può essere usato nei bambini e negli adolescenti.

Altri medicinali e Tiocalmina

Informi il medico o il farmacista se lei/il bambino sta usando, ha recentemente usato o potrebbe usare qualsiasi altro medicinale.

Gravidanza e allattamento

Se sospetta o sta pianificando una gravidanza chiedi consiglio al medico prima di prendere questo medicinale.

Gravidanza

- **Non** usi Tiocalmina durante la gravidanza

Allattamento

- **Non** usi Tiocalmina se sta allattando con latte materno

Guida di veicoli e utilizzo di macchinari

Poiché Tiocalmina può causare spossatezza e sonnolenza, faccia particolare attenzione nella guida di veicoli e nella manovra di macchinari.

Tiocalmina contiene saccarosio, etanolo e metile paraidrossibenzoato

Questo medicinale contiene 4,4 g di saccarosio (zucchero) per dose.

Se il medico le ha diagnosticato una intolleranza ad alcuni zuccheri, lo contatti prima di prendere questo medicinale.

Questo medicinale contiene 346 mg di alcol (etanolo) in ogni dose (1 cucchiaino) che è equivalente a 24 mg/ml. La quantità in 1 cucchiaino di questo medicinale è equivalente a meno di 9 ml di birra o 4 ml di vino.

La quantità di alcol in questo medicinale non sembra avere effetto su adulti e adolescenti e i suoi effetti nei bambini non sono evidenti. Potrebbero verificarsi alcuni effetti nei bambini piccoli, per esempio sentirsi assonnati.

L'alcol in questo medicinale può alterare gli effetti di altri medicinali. Parli con il medico o il farmacista se sta assumendo altri medicinali.

Se ha una dipendenza da alcol, parli con il medico prima di assumere questo medicinale.

Questo medicinale contiene 22,5 mg di p-idrossibenzoato per dose, equivalente a 150mg/100 ml.

3. Come prendere Tiocalmina

Prenda questo medicinale seguendo sempre esattamente quanto riportato in questo foglio o le istruzioni del medico o del farmacista. Se ha dubbi consulti il medico o il farmacista.

Quanto ne deve prendere

Adulti

La dose raccomandata è 1 cucchiaino da 2 a 4 volte al giorno.

Bambini

La dose raccomandata è 1 cucchiaino 2 volte al giorno.

Non superi le dosi indicate senza il consiglio del medico.


Durata del trattamento

Prenda Tiocalmina solo per brevi periodi di trattamento.

Consulti il medico se il disturbo si presenta ripetutamente o se ha notato un qualsiasi cambiamento recente delle sue caratteristiche.

Modo d'uso

Prenda Tiocalmina tal quale o diluito nella bevanda preferita (calda o fredda), preferibilmente lontano dai pasti.



CHIUSURA DI SICUREZZA A PROVA DI BAMBINO

Per aprire preme sulla capsula di chiusura svitandola contemporaneamente nel senso indicato dalla freccia.

Se prende più Tiocalmina di quanto deve

In caso di ingestione/assunzione accidentale di una dose eccessiva di Tiocalmina avverta immediatamente il medico o si rivolga al più vicino ospedale.

Se dimentica di prendere Tiocalmina

Non prenda una dose doppia per compensare la dimenticanza della dose.

Se interrompe il trattamento con Tiocalmina

Se ha qualsiasi dubbio sull'uso di questo medicinale, si rivolga al medico o al farmacista.

4. Possibili effetti indesiderati

Come tutti i medicinali, questo medicinale può causare effetti indesiderati sebbene non tutte le persone li manifestino.

I seguenti effetti indesiderati possono verificarsi a seguito dell'uso di Tiocalmina:

- nausea,
- disturbi allo stomaco e all'intestino

Questi effetti indesiderati sono rari e generalmente passeggeri. Quando si presentano consulti il medico o il farmacista.

Segnalazione degli effetti indesiderati

Se manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista. Può inoltre segnalare gli effetti indesiderati direttamente tramite il sistema nazionale di segnalazione all'indirizzo <https://www.aifa.gov.it/content/segnalazioni-reazioni-avverse>.

Segnalando gli effetti indesiderati lei può contribuire a fornire maggiori informazioni sulla sicurezza di questo medicinale.

5. Come conservare Tiocalmina

Conservi questo medicinale fuori dalla vista e dalla portata dei bambini.

Questo medicinale non richiede alcuna temperatura particolare di conservazione.

Non usi questo medicinale dopo la data di scadenza che è riportata sulla scatola e sul flacone dopo Scad.

La data di scadenza si riferisce all'ultimo giorno di quel mese.

Tale data si riferisce al prodotto in confezionamento integro, correttamente conservato.

Il periodo di validità dopo prima apertura del flacone è di 6 mesi (annotare la data di prima apertura nell'apposito spazio sull'astuccio).

Non getti alcun medicinale nell'acqua di scarico e nei rifiuti domestici. Chieda al farmacista come eliminare i medicinali che non utilizza più. Questo aiuterà a proteggere l'ambiente.

6. Contenuto della confezione e altre informazioni

Cosa contiene Tiocalmina

- I principi attivi sono potassio solfoguaiacolato 1,2 g, dropropizina 0,1 g (presenti in 100 ml di sciroppo)
- Gli altri componenti sono **saccarosio, etanolo 96%, metile p-idrossibenzoato** (vedere paragrafo 2. Tiocalmina contiene saccarosio, etanolo e metile paraidrossibenzoato), aroma essenza arancio dolce, acido citrico monoidrato, acqua depurata.

Descrizione dell'aspetto di Tiocalmina e contenuto della confezione

Tiocalmina si presenta in forma di sciroppo, da somministrare per bocca.

È disponibile in confezione da 200 g.

Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio e produttore

Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio

POLIFARMA BENESSERE S.r.l. – Via del Poggio Laurentino, 2 – 00144 ROMA

Produttori

Istituto De Angeli S.r.l. – Loc. Prulli 103/C – Reggello 50066 (FI)

Aeffe Farmaceutici S.r.l. – Via Torino 448 – Brandizzo 10032 (TO)

Questo foglio illustrativo è stato aggiornato il

Agenzia Italiana del Farmaco