

Foglio illustrativo: informazioni per l'utilizzatore

FITOSTIMOLINE 600 mg ovuli

estratto acquoso di Triticum vulgare

Legga attentamente questo foglio prima di usare questo medicinale perché contiene importanti informazioni per lei.

Usi questo medicinale sempre come esattamente descritto in questo foglio o come il medico o farmacista le ha detto di fare.

- Conservi questo foglio. Potrebbe aver bisogno di leggerlo di nuovo.
- Se desidera maggiori informazioni o consigli, si rivolga al farmacista.
- Se si manifesta uno qualsiasi degli effetti indesiderati, tra cui effetti non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista. Vedere paragrafo 4.
- Si rivolga al medico se non nota miglioramenti o se nota un peggioramento dei sintomi.

Contenuto di questo foglio:

1. Cos'è FITOSTIMOLINE 600 mg ovuli e a cosa serve
2. Cosa deve sapere prima di usare FITOSTIMOLINE 600 mg ovuli
3. Come usare FITOSTIMOLINE 600 mg ovuli
4. Possibili effetti indesiderati
5. Come conservare FITOSTIMOLINE 600 mg ovuli
6. Contenuto della confezione e altre informazioni

1. Cos'è FITOSTIMOLINE 600 mg ovuli e a cosa serve

FITOSTIMOLINE 600 mg ovuli contiene estratto acquoso di Triticum vulgare ed è indicato in soggetti adulti per il trattamento delle malattie flogistiche (con componente infiammatoria) e distrofiche (con piccole lesioni) di qualsiasi natura dell'apparato genitale femminile.

Si rivolga al medico se non si sente meglio o se si sente peggio dopo il trattamento.

2. Cosa deve sapere prima di usare FITOSTIMOLINE 600 mg ovuli

Non usi FITOSTIMOLINE 600 mg ovuli

Se è allergico al principio attivo (estratto acquoso di Triticum vulgare) o ad uno qualsiasi degli altri componenti di questo medicinale (elencati al paragrafo 6).

Non utilizzi FITOSTIMOLINE 600 mg ovuli nei bambini o adolescenti (vedere "Bambine e adolescenti").

Avvertenze e precauzioni

Si rivolga al medico o al farmacista prima di usare FITOSTIMOLINE 600 mg ovuli.

Interrompa subito il trattamento se si verificano fenomeni di sensibilizzazione (eccessiva reattività verso il prodotto). L'uso, specie se prolungato, di tutti i prodotti per uso topico (locale) può dare origine a fenomeni di questo tipo.

Sospenda il trattamento anche in caso di sviluppo di germi insensibili (che non rispondono al trattamento con il farmaco).

Bambine e adolescenti

Non utilizzi FITOSTIMOLINE 600 mg ovuli nelle bambine o adolescenti (vedere "Non usi FITOSTIMOLINE 600 mg ovuli").

Altri medicinali e FITOSTIMOLINE 600 mg ovuli

Informi il medico o il farmacista se sta assumendo, ha recentemente assunto o potrebbe assumere qualsiasi altro medicinale.

Non sono note interazioni tra FITOSTIMOLINE 600 mg ovuli ed altri farmaci.

Gravidanza e allattamento

Se è in corso una gravidanza, se sospetta o sta pianificando una gravidanza, o se sta allattando con latte materno chieda consiglio al medico o al farmacista prima di usare questo medicinale.

Può usare FITOSTIMOLINE 600 mg ovuli se è in gravidanza o se sta allattando.

Guida di veicoli e utilizzo di macchinari

FITOSTIMOLINE 600 mg ovuli non altera la capacità di guidare veicoli o di utilizzare macchinari.

3. Come usare FITOSTIMOLINE 600 mg ovuli

Usi questo medicinale seguendo sempre esattamente quanto riportato in questo foglio o le istruzioni del medico o del farmacista. Se ha dubbi consulti il medico o il farmacista.

La dose raccomandata è di 1 ovulo alla sera o secondo il parere del medico.

Modalità di applicazione:

Introdurre l'ovulo profondamente in vagina.

Se usa più FITOSTIMOLINE 600 mg ovuli di quanto deve

Non sono stati riportati casi di sovradosaggio.

Se ha qualsiasi dubbio sull'uso di questo medicinale, si rivolga al medico o al farmacista.

4. Possibili effetti indesiderati

Come tutti i medicinali, questo medicinale può causare effetti indesiderati sebbene non tutte le persone li manifestino.

Non sono stati segnalati effetti indesiderati.

L'uso, specie se prolungato, di tutti i prodotti per uso topico può dare origine a fenomeni di sensibilizzazione.

Il rispetto delle istruzioni contenute nel foglio illustrativo riduce il rischio di effetti indesiderati.

Segnalazione degli effetti indesiderati

Se manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista. Può inoltre segnalare gli effetti indesiderati direttamente tramite il sistema nazionale di segnalazione all'indirizzo <https://www.aifa.gov.it/content/segnalazioni-reazioni-avverse>.

Segnalando gli effetti indesiderati può contribuire a fornire maggiori informazioni sulla sicurezza di questo medicinale.

5. Come conservare FITOSTIMOLINE 600 mg ovuli

Conservi questo medicinale fuori dalla vista e dalla portata dei bambini.

Non usi questo medicinale dopo la data di scadenza che è riportata sulla confezione. La data di scadenza si riferisce all'ultimo giorno di quel mese e al prodotto in confezionamento integro, correttamente conservato.

Non conservare a temperatura superiore ai 25°C.

Non getti alcun medicinale nell'acqua di scarico e nei rifiuti domestici. Chiedi al farmacista come eliminare i medicinali che non utilizzi più. Questo aiuterà a proteggere l'ambiente.

6. Contenuto della confezione e altre informazioni

Cosa contiene FITOSTIMOLINE 600 mg ovuli

Un ovulo da 3,5 g contiene:

Principio attivo: estratto acquoso di *Triticum vulgare* (residuo secco pari a 200 mg/100 ml) 600 mg.

Altri componenti: 2-fenossietanolo; macrogol 400; macrogol 1500; macrogol 12000.

Descrizione dell'aspetto di FITOSTIMOLINE 600 mg ovuli e contenuto della confezione

Ovuli di colore bianco omogenei.

Confezione da 6 ovuli da 3,5 g.

Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio e produttore

FARMACEUTICI DAMOR S.p.A. Via E. Scaglione, 27 - 80145 Napoli.

Questo foglio illustrativo è stato aggiornato il

Foglio illustrativo: informazioni per l'utilizzatore

FITOSTIMOLINE 20 % crema vaginale

estratto acquoso di Triticum vulgare

Legga attentamente questo foglio prima di usare questo medicinale perché contiene importanti informazioni per lei.

Usi questo medicinale sempre come esattamente descritto in questo foglio o come il medico o il farmacista le ha detto di fare.

- Conservi questo foglio. Potrebbe aver bisogno di leggerlo di nuovo.
- Se desidera maggiori informazioni o consigli, si rivolga al farmacista.
- Se si manifesta uno qualsiasi degli effetti indesiderati, tra cui effetti non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista. Vedere paragrafo 4.
- Si rivolga al medico se non nota miglioramenti o se nota un peggioramento dei sintomi.

Contenuto di questo foglio:

1. Cos'è FITOSTIMOLINE 20 % crema vaginale e a cosa serve
2. Cosa deve sapere prima di usare FITOSTIMOLINE 20 % crema vaginale
3. Come usare FITOSTIMOLINE 20 % crema vaginale
4. Possibili effetti indesiderati
5. Come conservare FITOSTIMOLINE 20 % crema vaginale
6. Contenuto della confezione e altre informazioni

1. Cos'è FITOSTIMOLINE 20 % crema vaginale e a cosa serve

FITOSTIMOLINE 20 % crema vaginale contiene estratto acquoso di Triticum vulgare ed è indicato in soggetti adulti per il trattamento delle malattie flogistiche (con componente infiammatoria) e distrofiche (con piccole lesioni) di qualsiasi natura dell'apparato genitale femminile.

Si rivolga al medico se non si sente meglio o se si sente peggio dopo il trattamento.

2. Cosa deve sapere prima di usare FITOSTIMOLINE 20 % crema vaginale

Non usi FITOSTIMOLINE 20 % crema vaginale

Se è allergico al principio attivo (estratto acquoso di Triticum vulgare) o ad uno qualsiasi degli altri componenti di questo medicinale (elencati al paragrafo 6).

Non utilizzi FITOSTIMOLINE 20 % crema vaginale nei bambini o adolescenti (vedere "Bambine e adolescenti").

Avvertenze e precauzioni

Si rivolga al medico o al farmacista prima di usare FITOSTIMOLINE 20 % crema vaginale.

Interrompa subito il trattamento se si verificano fenomeni di sensibilizzazione (eccessiva reattività verso il prodotto). L'uso, specie se prolungato, di tutti i prodotti per uso topico (locale) può dare origine a fenomeni di questo tipo.

Sospenda il trattamento anche in caso di sviluppo di germi insensibili (che non rispondono al trattamento con il farmaco).

Bambine e adolescenti

Non utilizzi FITOSTIMOLINE 20 % crema vaginale nelle bambine o adolescenti (vedere “Non usi FITOSTIMOLINE 20 %crema vaginale”).

Altri medicinali e FITOSTIMOLINE 20 % crema vaginale

Informi il medico o il farmacista se sta assumendo, ha recentemente assunto o potrebbe assumere qualsiasi altro medicinale.

Non sono note interazioni tra FITOSTIMOLINE 20 % crema vaginale ed altri farmaci.

Gravidanza e allattamento

Se è in corso una gravidanza, se sospetta o sta pianificando una gravidanza, o se sta allattando con latte materno chieda consiglio al medico o al farmacista prima di usare questo medicinale.

Può usare FITOSTIMOLINE 20 %crema vaginale se è in gravidanza o se sta allattando.

Guida di veicoli e utilizzo di macchinari

FITOSTIMOLINE 20 %crema vaginale non altera la capacità di guidare veicoli o di utilizzare macchinari.

FITOSTIMOLINE 20 %crema vaginale contiene alcool cetil stearilico che può causare reazioni cutanee locali (ad es. dermatiti da contatto).

FITOSTIMOLINE 20 %crema vaginale contiene metil paraidrossibenzoato e propil paraidrossibenzoato che può causare reazioni allergiche (anche ritardate).

3. Come usare FITOSTIMOLINE 20 % crema vaginale

Usi questo medicinale seguendo sempre esattamente quanto riportato in questo foglio o le istruzioni del medico o del farmacista. Se ha dubbi consulti il medico o il farmacista.

La dose raccomandata è di 1-2 applicazioni vaginali al giorno o secondo il parere del medico.

Modalità di applicazione:

- 1) Perfori la prima volta il tubo di crema, utilizzando il perforatore contenuto nella parte superiore del tappo di chiusura.
- 2) Avviti un applicatore vaginale.
- 3) Prema il tubo di crema fino al riempimento totale dell'applicatore.
- 4) Svitì l'applicatore dal tubo, lo introduca nella vagina e prema lo stantuffo fino al termine della sua corsa.
- 5) Utilizzi ogni applicatore una sola volta.

Se usa più FITOSTIMOLINE 20 % crema vaginale di quanto deve

Non sono stati riportati casi di sovradosaggio.

Se ha qualsiasi dubbio sull'uso di questo medicinale, si rivolga al medico o al farmacista.

4. Possibili effetti indesiderati

Come tutti i medicinali, questo medicinale può causare effetti indesiderati sebbene non tutte le persone li manifestino.

Non sono stati segnalati effetti indesiderati.

L'uso, specie se prolungato, di tutti i prodotti per uso topico può dare origine a fenomeni di sensibilizzazione.

Il rispetto delle istruzioni contenute nel foglio illustrativo riduce il rischio di effetti indesiderati.

Segnalazione degli effetti indesiderati

Se manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista. Può inoltre segnalare gli effetti indesiderati direttamente tramite il sistema nazionale di segnalazione all'indirizzo <https://www.aifa.gov.it/content/segnalazioni-reazioni-avverse>.

Segnalando gli effetti indesiderati può contribuire a fornire maggiori informazioni sulla sicurezza di questo medicinale.

5. Come conservare FITOSTIMOLINE 20 %crema vaginale

Conservi questo medicinale fuori dalla vista e dalla portata dei bambini.

Non usi questo medicinale dopo la data di scadenza che è riportata sulla confezione. La data di scadenza si riferisce all'ultimo giorno di quel mese e al prodotto in confezionamento integro, correttamente conservato.

Questo medicinale non richiede alcuna condizione particolare di conservazione.

Non getti alcun medicinale nell'acqua di scarico e nei rifiuti domestici. Chiedi al farmacista come eliminare i medicinali che non utilizzi più. Questo aiuterà a proteggere l'ambiente.

6. Contenuto della confezione e altre informazioni

Cosa contiene FITOSTIMOLINE 20 % crema vaginale

100 g di crema contengono:

Principio attivo: estratto acquoso di Triticum vulgare (residuo secco pari a 200 mg/100 ml) 20 g.

Altri componenti: 2-fenossietanolo; glicerina; vaselina bianca; sodio cetil stearyl solfato; alcool cetil stearylco; decil oleato; metile paraidrossibenzoato; propile paraidrossibenzoato; acqua depurata.

Descrizione dell'aspetto di FITOSTIMOLINE 20 %crema vaginale e contenuto della confezione

Crema vaginale di colore bianco omogenea.

Tubo contenente 60 g di crema con 12 applicatori vaginali monouso.

Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio e produttore

FARMACEUTICI DAMOR S.p.A. Via E. Scaglione, 27 - 80145 Napoli.

Questo foglio illustrativo è stato aggiornato il

Foglio illustrativo: informazioni per l'utilizzatore

FITOSTIMOLINE 4 % soluzione vaginale

estratto acquoso di Triticum vulgare

Legga attentamente questo foglio prima di usare questo medicinale perché contiene importanti informazioni per lei.

Usi questo medicinale sempre come esattamente descritto in questo foglio o come il medico o farmacista le ha detto di fare.

- Conservi questo foglio. Potrebbe aver bisogno di leggerlo di nuovo.
- Se desidera maggiori informazioni o consigli, si rivolga al farmacista.
- Se si manifesta uno qualsiasi degli effetti indesiderati, tra cui effetti non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista. Vedere paragrafo 4.
- Si rivolga al medico se non nota miglioramenti o se nota un peggioramento dei sintomi.

Contenuto di questo foglio:

1. Cos'è FITOSTIMOLINE 4 % soluzione vaginale e a cosa serve
2. Cosa deve sapere prima di usare FITOSTIMOLINE 4 % soluzione vaginale
3. Come usare FITOSTIMOLINE 4 % soluzione vaginale
4. Possibili effetti indesiderati
5. Come conservare FITOSTIMOLINE 4 % soluzione vaginale
6. Contenuto della confezione e altre informazioni

1. Cos'è FITOSTIMOLINE 4 % soluzione vaginale e a cosa serve

FITOSTIMOLINE 4 % soluzione vaginale contiene estratto acquoso di Triticum vulgare ed è indicato in soggetti adulti per il trattamento delle malattie flogistiche (con componente infiammatoria) e distrofiche (con piccole lesioni) di qualsiasi natura dell'apparato genitale femminile.

FITOSTIMOLINE 4 % soluzione vaginale è indicato anche nella prevenzione pre e post-operatoria in caso di interventi chirurgici ginecologici.

Si rivolga al medico se non si sente meglio o se si sente peggio dopo il trattamento.

2. Cosa deve sapere prima di usare FITOSTIMOLINE 4 % soluzione vaginale

Non usi FITOSTIMOLINE 4 % soluzione vaginale

Se è allergico al principio attivo (estratto acquoso di Triticum vulgare) o ad uno qualsiasi degli altri componenti di questo medicinale (elencati al paragrafo 6).

Non utilizzi FITOSTIMOLINE 4 % soluzione vaginale nei bambini o adolescenti (vedere "Bambine e adolescenti").

Avvertenze e precauzioni

Si rivolga al medico o al farmacista prima di usare FITOSTIMOLINE 4 % soluzione vaginale.

Interrompa subito il trattamento se si verificano fenomeni di sensibilizzazione (eccessiva reattività verso il prodotto). L'uso, specie se prolungato, di tutti i prodotti per uso topico (locale) può dare origine a fenomeni di questo tipo.

Sospenda il trattamento anche in caso di sviluppo di germi insensibili (che non rispondono al trattamento con il farmaco).

Bambine e adolescenti

Non utilizzi FITOSTIMOLINE 4 % soluzione vaginale nelle bambine o adolescenti (vedere “Non usi FITOSTIMOLINE 4 % soluzione vaginale”).

Altri medicinali e FITOSTIMOLINE 4 % soluzione vaginale

Informi il medico o il farmacista se sta assumendo, ha recentemente assunto o potrebbe assumere qualsiasi altro medicinale.

Non sono note interazioni tra FITOSTIMOLINE 4 % soluzione vaginale ed altri farmaci.

Gravidanza e allattamento

Se è in corso una gravidanza, se sospetta o sta pianificando una gravidanza, o se sta allattando con latte materno chieda consiglio al medico o al farmacista prima di usare questo medicinale.

Può usare FITOSTIMOLINE 4 % soluzione vaginale se è in gravidanza o se sta allattando.

Guida di veicoli e utilizzo di macchinari

FITOSTIMOLINE 4 % soluzione vaginale non altera la capacità di guidare veicoli o di utilizzare macchinari.

FITOSTIMOLINE 4 % soluzione vaginale contiene benzalconio cloruro che può causare reirritazione locale.

3. Come usare FITOSTIMOLINE 4 % soluzione vaginale

Usi questo medicinale seguendo sempre esattamente quanto riportato in questo foglio o le istruzioni del medico o del farmacista. Se ha dubbi consulti il medico o il farmacista.

La dose raccomandata è di 1-2 applicazioni vaginali al giorno o secondo il parere del medico.

Modalità di applicazione:

- 1) Tenga il flacone per l'anello di chiusura e pieghi il cappuccio sino a rottura del sigillo di sicurezza.
- 2) Estragga la cannula sino al suo arresto in modo da avvertire lo scatto del giusto posizionamento.
Attenzione: solo una corretta estrazione della cannula permette una completa fuoriuscita del liquido.
- 3) Introduca delicatamente la cannula in vagina, orientandola con l'angolazione desiderata.
- 4) Prema lentamente le pareti del flacone in modo da permetterne il completo svuotamento.

L'applicazione va eseguita preferibilmente in posizione distesa, trattenendo il liquido in vagina per alcuni minuti.

Se usa più FITOSTIMOLINE 4 % soluzione vaginale di quanto deve

Non sono stati riportati casi di sovradosaggio.

Se ha qualsiasi dubbio sull'uso di questo medicinale, si rivolga al medico o al farmacista.

4. Possibili effetti indesiderati

Come tutti i medicinali, questo medicinale può causare effetti indesiderati sebbene non tutte le persone li manifestino.

Non sono stati segnalati effetti indesiderati.

L'uso, specie se prolungato, di tutti i prodotti per uso topico può dare origine a fenomeni di sensibilizzazione. Il rispetto delle istruzioni contenute nel foglio illustrativo riduce il rischio di effetti indesiderati.

Segnalazione degli effetti indesiderati

Se manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista. Può inoltre segnalare gli effetti indesiderati direttamente tramite il sistema nazionale di segnalazione all'indirizzo <https://www.aifa.gov.it/content/segnalazioni-reazioni-avverse>.

Segnalando gli effetti indesiderati lei può contribuire a fornire maggiori informazioni sulla sicurezza di questo medicinale.

5. Come conservare FITOSTIMOLINE 4 % soluzione vaginale

Conservi questo medicinale fuori dalla vista e dalla portata dei bambini.

Non usi questo medicinale dopo la data di scadenza che è riportata sulla confezione. La data di scadenza si riferisce all'ultimo giorno di quel mese e al prodotto in confezionamento integro, correttamente conservato.

Questo medicinale non richiede alcuna condizione particolare di conservazione.

Non getti alcun medicinale nell'acqua di scarico e nei rifiuti domestici. Chiedi al farmacista come eliminare i medicinali che non utilizza più. Questo aiuterà a proteggere l'ambiente.

6. Contenuto della confezione e altre informazioni

Cosa contiene FITOSTIMOLINE 4 % soluzione vaginale

100 ml di soluzione contengono:

Principio attivo: estratto acquoso di Triticum vulgare 4 g (residuo secco pari a 200 mg/100 ml).

Altri componenti: 2-fenossietanolo; benzalconio cloruro; acqua depurata.

Descrizione dell'aspetto di FITOSTIMOLINE 4 % soluzione vaginale e contenuto della confezione

Soluzione vaginale. Soluzione limpida leggermente giallina.

5 flaconi in plastica da 140 ml, corredati di cannula vaginale preinserita.

Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio e produttore

Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio

FARMACEUTICI DAMOR S.p.A. Via E. Scaglione, 27 - 80145 Napoli.

Produttore

FARMACEUTICI DAMOR S.p.A. Via E. Scaglione, 27 - 80145 Napoli.

COC FARMACEUTICI S. r. l. Via Modena 15 - 40019 Sant'Agata Bolognese (BO).

Questo foglio illustrativo è stato aggiornato il

Foglio illustrativo: informazioni per l'utilizzatore

FITOSTIMOLINE 15% crema

Estratto acquoso di Triticum vulgare

Legga attentamente questo foglio prima di usare questo medicinale perché contiene importanti informazioni per lei.

Usi questo medicinale sempre come esattamente descritto in questo foglio o come il medico o farmacista le ha detto di fare.

- Conservi questo foglio. Potrebbe aver bisogno di leggerlo di nuovo.
- Se desidera maggiori informazioni o consigli, si rivolga al farmacista.
- Se si manifesta uno qualsiasi degli effetti indesiderati, tra cui effetti non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista. Vedere paragrafo 4.
- Si rivolga al medico se non nota miglioramenti o se nota un peggioramento dei sintomi.

Contenuto di questo foglio:

1. Cos'è FITOSTIMOLINE 15% crema e a cosa serve
2. Cosa deve sapere prima di usare FITOSTIMOLINE 15% crema
3. Come usare FITOSTIMOLINE 15% crema
4. Possibili effetti indesiderati
5. Come conservare FITOSTIMOLINE 15% crema
6. Contenuto della confezione e altre informazioni

1. COS'È FITOSTIMOLINE 15% crema E A COSA SERVE

FITOSTIMOLINE 15% crema contiene un estratto acquoso di Triticum vulgare ed ha azione cicatrizzante.

Questo medicinale è indicato per il trattamento di erosioni superficiali della pelle e di piaghe da decubito di lieve entità (lesioni della pelle che insorgono nelle parti del corpo più a lungo soggette a pressione durante una lunga permanenza a letto o in posizione seduta).

2. COSA DEVE SAPERE PRIMA DI USARE FITOSTIMOLINE 15% Crema

Non usi FITOSTIMOLINE 15% crema

Se è allergico al principio attivo estratto acquoso di Triticum vulgare o ad uno qualsiasi degli altri componenti di questo medicinale (elencati al paragrafo 6).

Avvertenze e precauzioni

Si rivolga al medico o al farmacista prima di usare FITOSTIMOLINE 15% crema.

Interrompa subito il trattamento se si verificano fenomeni di sensibilizzazione (eccessiva reattività verso il prodotto). L'uso, specie se prolungato, di tutti i prodotti per uso topico (locale) può dare origine a fenomeni di questo tipo.

Sospenda il trattamento anche se si dovessero sviluppare infezioni.

Altri medicinali e FITOSTIMOLINE 15% crema

Informi il medico o il farmacista se sta assumendo, ha recentemente assunto o potrebbe assumere qualsiasi altro medicinale.

Non sono note interazioni tra FITOSTIMOLINE 15% crema ed altri farmaci.

Gravidanza, allattamento e fertilità

Se è in corso una gravidanza, se sospetta o sta pianificando una gravidanza, o se sta allattando con latte materno chieda consiglio al medico o al farmacista prima di usare questo medicinale.

FITOSTIMOLINE 15% crema può essere utilizzato in gravidanza o durante l'allattamento, sempre sotto controllo medico.

Guida di veicoli e utilizzo di macchinari

FITOSTIMOLINE 15% crema non altera la capacità di guidare veicoli o di utilizzare macchinari.

FITOSTIMOLINE 15% crema contiene alcool stearilico e alcool cetilico che possono causare reazioni cutanee locali (ad es. dermatiti da contatto).

3. COME USARE FITOSTIMOLINE 15% crema

Usi questo medicinale seguendo sempre esattamente quanto riportato in questo foglio o le istruzioni del medico o del farmacista. Se ha dubbi consulti il medico o il farmacista.

La dose raccomandata è di 2 applicazioni al giorno. Tali applicazioni, secondo entità, estensione e localizzazione delle manifestazioni, possono consistere in semplici massaggi di assorbimento, oppure potrebbe essere necessario ricoprire la parte interessata secondo le modalità di applicazione suggerite.

Modalità di applicazione

Per aprire la prima volta il tubo, perfori la membrana protettiva del tubo utilizzando il perforatore contenuto nella parte superiore del tappo di chiusura.

Spalmi un'adeguata quantità di crema sulla parte interessata e ricopra la zona con garza sterile, eventualmente impregnata con la stessa crema allo scopo di mantenere la morbidezza e la plasticità dell'applicazione della stessa.

Nelle successive medicazioni, salvo specifiche controindicazioni, sarà sufficiente effettuare un lavaggio della parte di pelle interessata con semplice acqua sterile, in quanto la crema è completamente idrodispersibile (si scioglie in acqua) e non lascia residui.

Se usa più FITOSTIMOLINE 15% crema di quanto deve

Non sono stati riportati casi di sovradosaggio.

Se ha qualsiasi dubbio sull'uso di questo medicinale, si rivolga al medico o al farmacista.

4. POSSIBILI EFFETTI INDESIDERATI

Come tutti i medicinali, questo medicinale può causare effetti indesiderati sebbene non tutte le persone li manifestino.

Non sono stati al momento segnalati effetti indesiderati.

Il rispetto delle istruzioni contenute nel foglio illustrativo riduce il rischio di effetti indesiderati.

Segnalazione degli effetti indesiderati

Se manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista. Lei può inoltre segnalare gli effetti indesiderati direttamente tramite il sistema nazionale di segnalazione all'indirizzo <https://www.aifa.gov.it/content/segnalazioni-reazioni-avverse>. Segnalando gli effetti indesiderati lei può contribuire a fornire maggiori informazioni sulla sicurezza di questo medicinale.

5. COME CONSERVARE FITOSTIMOLINE 15% crema

Conservi questo medicinale fuori dalla vista e dalla portata dei bambini.

Non usi questo medicinale dopo la data di scadenza che è riportata sulla confezione. La data di scadenza si riferisce all'ultimo giorno di quel mese e al prodotto in confezionamento integro, correttamente conservato. Conservi il prodotto a temperatura inferiore a 30 °C.

Non getti alcun medicinale nell'acqua di scarico e nei rifiuti domestici. Chiedi al farmacista come eliminare i medicinali che non utilizzi più. Questo aiuterà a proteggere l'ambiente.

6. CONTENUTO DELLA CONFEZIONE E ALTRE INFORMAZIONI

Cosa contiene FITOSTIMOLINE 15% crema

100 g di crema contengono:

Principio attivo: estratto acquoso di *Triticum vulgare* 15 g (residuo secco pari a 200 mg/100 ml).

Altri componenti: 2-fenossietanolo; macrogol 400; macrogol 1500; macrogol 3000; macrogol 4000; paraffina liquida; **alcool cetilico**; **alcool stearilico**; glicerina; acqua depurata.

Descrizione dell'aspetto di FITOSTIMOLINE 15% crema e contenuto della confezione

Crema.

Tubo di alluminio contenente 32 g di crema.

Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio e produttore

FARMACEUTICI DAMOR S.p.A. Via E. Scaglione, 27 - 80145 Napoli.

Questo foglio illustrativo è stato aggiornato il

Foglio illustrativo: informazioni per l'utilizzatore

FITOSTIMOLINE 15% garze impregnate

Estratto acquoso di Triticum vulgare

Legga attentamente questo foglio prima di usare questo medicinale perché contiene importanti informazioni per lei.

Usi questo medicinale sempre come esattamente descritto in questo foglio o come il medico o farmacista le ha detto di fare.

- Conservi questo foglio. Potrebbe aver bisogno di leggerlo di nuovo.
- Se desidera maggiori informazioni o consigli, si rivolga al farmacista.
- Se si manifesta uno qualsiasi degli effetti indesiderati, tra cui effetti non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista. Vedere paragrafo 4.
- Si rivolga al medico se non nota miglioramenti o se nota un peggioramento dei sintomi.

Contenuto di questo foglio:

1. Cos'è FITOSTIMOLINE 15% garze impregnate e a cosa serve
2. Cosa deve sapere prima di usare FITOSTIMOLINE 15% garze impregnate
3. Come usare FITOSTIMOLINE 15% garze impregnate
4. Possibili effetti indesiderati
5. Come conservare FITOSTIMOLINE 15% garze impregnate
6. Contenuto della confezione e altre informazioni

1. COS'È FITOSTIMOLINE 15% garze impregnate E A COSA SERVE

FITOSTIMOLINE 15% garze impregnate contiene un estratto acquoso di Triticum vulgare ed ha azione cicatrizzante.

Questo medicinale è indicato per il trattamento di erosioni superficiali della pelle e di piaghe da decubito di lieve entità (lesioni della pelle che insorgono nelle parti del corpo più a lungo soggette a pressione durante una lunga permanenza a letto o in posizione seduta).

2. COSA DEVE SAPERE PRIMA DI USARE FITOSTIMOLINE 15% garze impregnate

Non usi FITOSTIMOLINE 15% garze impregnate

Se è allergico al principio attivo estratto acquoso di Triticum vulgare o ad uno qualsiasi degli altri componenti di questo medicinale (elencati al paragrafo 6).

Avvertenze e precauzioni

Si rivolga al medico o al farmacista prima di usare FITOSTIMOLINE 15% garze impregnate.

Interrompa subito il trattamento se si verificano fenomeni di sensibilizzazione (eccessiva reattività verso il prodotto). L'uso, specie se prolungato, di tutti i prodotti per uso topico (locale) può dare origine a fenomeni di questo tipo.

Sospenda il trattamento anche se si dovessero sviluppare infezioni.

Altri medicinali e FITOSTIMOLINE 15% garze impregnate

Informi il medico o il farmacista se sta assumendo, ha recentemente assunto o potrebbe assumere qualsiasi altro medicinale.

Non sono note interazioni tra FITOSTIMOLINE 15% garze impregnate ed altri farmaci.

Gravidanza, allattamento e fertilità

Se è in corso una gravidanza, se sospetta o sta pianificando una gravidanza, o se sta allattando con latte materno chieda consiglio al medico o al farmacista prima di usare questo medicinale.

FITOSTIMOLINE 15% garze impregnate può essere utilizzato in gravidanza o durante l'allattamento, sempre sotto controllo medico.

Guida di veicoli e utilizzo di macchinari

FITOSTIMOLINE 15% garze impregnate non altera la capacità di guidare veicoli o di utilizzare macchinari.

3. COME USARE FITOSTIMOLINE 15% garze impregnate

Usi questo medicinale seguendo sempre esattamente quanto riportato in questo foglio o le istruzioni del medico o del farmacista. Se ha dubbi consulti il medico o il farmacista.

La dose raccomandata è di 1-2 applicazioni al giorno.

Si assicuri che la medicazione resti sempre umida, morbida e plastica (deformabile).

Apra una busta, rimuova il film plastico protettivo, prelevi la garza e la applichi direttamente sulla parte preventivamente deterisa (pulita) e disinfettata.

Ricopra la zona con una garza sterile e, se necessario, con cotone idrofilo.

Nelle successive medicazioni, salvo specifiche controindicazioni, sarà sufficiente effettuare un lavaggio della parte interessata con soluzione sterile, in quanto la crema è completamente idrodispersibile (si scioglie in acqua) e non lascia residui.



Se usa più FITOSTIMOLINE 15% garze impregnate di quanto deve

Non sono stati riportati casi di sovradosaggio.

Se ha qualsiasi dubbio sull'uso di questo medicinale, si rivolga al medico o al farmacista.

4. POSSIBILI EFFETTI INDESIDERATI

Come tutti i medicinali, questo medicinale può causare effetti indesiderati sebbene non tutte le persone li manifestino.

Non sono stati al momento segnalati effetti indesiderati.

Il rispetto delle istruzioni contenute nel foglio illustrativo riduce il rischio di effetti indesiderati.

Segnalazione degli effetti indesiderati

Se manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista. Lei può inoltre segnalare gli effetti indesiderati direttamente tramite il sistema nazionale di segnalazione all'indirizzo <https://www.aifa.gov.it/content/segnalazioni-reazioni-avverse>. Segnalando gli effetti indesiderati lei può contribuire a fornire maggiori informazioni sulla sicurezza di questo medicinale.

5. COME CONSERVARE FITOSTIMOLINE 15% garze impregnate

Conservi questo medicinale fuori dalla vista e dalla portata dei bambini.

Non usi questo medicinale dopo la data di scadenza che è riportata sulla confezione. La data di scadenza si riferisce all'ultimo giorno di quel mese e al prodotto in confezionamento integro, correttamente conservato. Conservi il prodotto a temperatura inferiore a 30 °C.

Non getti alcun medicinale nell'acqua di scarico e nei rifiuti domestici. Chieda al farmacista come eliminare i medicinali che non utilizza più. Questo aiuterà a proteggere l'ambiente.

6. CONTENUTO DELLA CONFEZIONE E ALTRE INFORMAZIONI

Cosa contiene FITOSTIMOLINE 15% garze impregnate

Ogni garza è impregnata con 4 g di crema dalla seguente composizione (per 100 grammi):

Principio attivo: estratto acquoso di *Triticum vulgare* 15 g (residuo secco pari a 200 mg /100 ml).

In 4 g di crema (contenuto di ogni garza) sono presenti 0,6 g di estratto acquoso di *Triticum vulgare*.

Altri componenti: 2-fenossietanolo; macrogol 400; macrogol 600; macrogol 1500; macrogol 4000; glicerina; acqua depurata.

Descrizione dell'aspetto di FITOSTIMOLINE 15% garze impregnate e contenuto della confezione

10 Garze impregnate 10 cm x 10 cm impregnate con 4 grammi di crema bianca fluida idrodispersibile, confezionate in buste singole.

Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio e produttore

FARMACEUTICI DAMOR S.p.A. Via E. Scaglione, 27 - 80145 Napoli.

Questo foglio illustrativo è stato aggiornato il