

Foglio illustrativo: informazioni per il paziente

VISUGLICAN 40mg/ml + 2mg/ml Collirio, soluzione Sodio cromoglicato e Clorfenamina maleato

Legga attentamente questo foglio prima di usare questo medicinale perché contiene importanti informazioni per lei.

Usi questo medicinale sempre come esattamente descritto in questo foglio o come il medico o il farmacista le hanno detto di fare

- Conservi questo foglio. Potrebbe aver bisogno di leggerlo di nuovo.
- Se desidera maggiori informazioni o consigli, si rivolga al farmacista.
- Se si manifesta uno qualsiasi degli effetti indesiderati, tra cui effetti non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista. Vedere paragrafo 4.
- Si rivolga al medico se non nota miglioramenti o se nota un peggioramento dei sintomi.

Contenuto di questo foglio:

- 1. Che cos'è VISUGLICAN e a cosa serve**
- 2. Cosa deve sapere prima di usare VISUGLICAN**
- 3. Come usare VISUGLICAN**
- 4. Possibili effetti indesiderati**
- 5. Come conservare VISUGLICAN**
- 6. Contenuto della confezione e altre informazioni**

1. Che cos'è VISUGLICAN e a cosa serve

VISUGLICAN appartiene ad un gruppo di farmaci chiamati decongestionanti ed antiallergici e contiene due principi attivi: Sodio cromoglicato e Clorfenamina maleato.

A cosa serve:

VISUGLICAN viene utilizzato per il trattamento delle congiuntiviti (infiammazioni dell'occhio) allergiche, primaverili o dovute a un agente tossico.

2. Cosa deve sapere prima di usare VISUGLICAN

Non usi VISUGLICAN

Se è allergico al sodio cromoglicato o alla clorfenamina maleato o ad uno qualsiasi degli altri componenti di questo medicinale (elencati al paragrafo 6).

Avvertenze e precauzioni

Si rivolga al medico o al farmacista prima di usare VISUGLICAN.

Altri medicinali e VISUGLICAN

Informi il medico o il farmacista se sta usando, ha recentemente usato o potrebbe usare qualsiasi altro medicinale.

Non sono note interazioni con altri medicinali. Tuttavia sono possibili effetti additivi quando VISUGLICAN è somministrato contemporaneamente ad H2 antagonisti (ad esempio cimetidina, medicinale per il trattamento dell'ulcera) e con corticosteroidi (medicinali che riducono l'infiammazione e l'azione del sistema immunitario).

Gravidanza e allattamento

Se è in corso una gravidanza, se sospetta o sta pianificando una gravidanza, o se sta allattando con latte materno chiedi consiglio al medico o al farmacista prima di usare questo medicinale.

Gravidanza

Come per ogni farmaco è opportuno, quando possibile, evitare la somministrazione durante il primo trimestre di gravidanza.

Allattamento

Se l'uso di questo prodotto è ritenuto essenziale in una madre che allatta, la paziente deve sospendere l'allattamento.

Guida di veicoli e utilizzo di macchinari

VISUGLICAN non altera la capacità di guidare veicoli o di usare macchinari.

Visuglican flacone da 10 ml contiene fosfato bisodico 6,50 mg per 1 ml equivalente a 65 mg/10 ml e fosfato monosodico 2 mg per 1 ml equivalente a 20 mg/10 ml come tamponanti.


Visuglican monodose contiene fosfato bisodico 8,12 mg per 1 ml equivalente a 4,06 mg/0,5 ml e fosfato monosodico 4,5 mg per 1 ml equivalente a 2,25 mg/0,5 ml come tamponanti.

Se ha un grave danno allo strato trasparente più esterno dell'occhio (la cornea), i fosfati possono causare in casi molto rari macchie opache sulla cornea dovute ad accumulo di calcio durante il trattamento.

3. Come usare VISUGLICAN

Usi questo medicinale seguendo sempre esattamente quanto riportato in questo foglio o le istruzioni del medico o del farmacista. Se ha dubbi consulti il medico o il farmacista. **La dose raccomandata** è 1-2 gocce nel fornice congiuntivale (spazio tra l'occhio e la palpebra) quattro volte al giorno.


3.1 Modo d'uso Visuglican Flacone da 10 ml multidose,



Rimuovere il tappo




Instillare 1-2 gocce nel fornice congiuntivale di ciascun occhio tirando la palpebra inferiore verso il basso e guardando verso l'alto. Erogare il prodotto premendo leggermente il fondo del flacone, spingendo la punta dell'erogatore verso il basso.




Dopo l'uso, richiudere immediatamente il contenitore. La soluzione può essere riutilizzata entro 2 mesi dalla prima apertura.

3.2 Modo d'uso Visuglican 25 Contenitori monodose:



SEPARARE



APRIRE



INSTILLARE

Dopo aver aperto la bustina di protezione di alluminio:

- separare un contenitore monodose dallo strip costituito da 5 contenitori monouso; prima dell'uso assicurarsi che il contenitore monodose sia intatto.
- ruotare ed aprire il tappo su sé stesso per l'apertura della monodose;
- instillare 1-2 gocce nel fornice congiuntivale, tirando leggermente la palpebra inferiore verso il basso e guardando verso l'alto.

Usi VISUGLICAN in contenitore monodose immediatamente dopo l'apertura.

L'eventuale residuo non deve essere riutilizzato. Eviti che l'estremità del contenitore venga a contatto con l'occhio o con qualsiasi altra superficie.

Se usa più VISUGLICAN di quanto deve

In caso di ingestione/assunzione accidentale di una dose eccessiva di VISUGLICAN avverta immediatamente il medico o si rivolga al più vicino ospedale.

Se dimentica di usare VISUGLICAN

Non usi una dose doppia per compensare la dimenticanza della dose.

Se ha qualsiasi dubbio sull'uso di questo medicinale, si rivolga al medico o al farmacista.

4. Possibili effetti indesiderati

Come tutti i medicinali, questo medicinale può causare effetti indesiderati sebbene non tutte le persone li manifestino.

Raramente sono stati riportati fenomeni irritativi e bruciore. In questi casi è consigliabile sospendere il trattamento.

Il rispetto delle istruzioni contenute nel foglio illustrativo riduce il rischio di effetti indesiderati.

Segnalazione degli effetti indesiderati

Se manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista. Lei può inoltre segnalare gli effetti indesiderati direttamente tramite il sistema nazionale di segnalazione al sito: <https://www.aifa.gov.it/web/guest/content/segnalazioni-reazioni-avverse>. Segnalando gli effetti indesiderati lei può contribuire a fornire maggiori informazioni sulla sicurezza di questo medicinale.

5. Come conservare VISUGLICAN

Conservi questo medicinale fuori dalla vista e dalla portata dei bambini.

Non usi questo medicinale dopo la data di scadenza che è riportata sulla confezione dopo Scad. La data di scadenza si riferisce all'ultimo giorno di quel mese.

Non usi questo medicinale se nota che la soluzione non è limpida.

La data di scadenza si riferisce al prodotto in confezionamento integro, correttamente conservato.

VISUGLICAN 40mg/ml + 2mg/ml Collirio, soluzione in Flacone non deve essere usato dopo 60 giorni dalla prima apertura. Tenere il flacone ermeticamente chiuso. Conservare a temperatura non superiore a 25° C.

VISUGLICAN 40mg/ml + 2mg/ml Collirio, soluzione in Contenitore monodose va usato solo immediatamente dopo l'apertura. L'eventuale residuo non deve essere riutilizzato.

Non getti alcun medicinale nell'acqua di scarico e nei rifiuti domestici. Chiedi al farmacista come eliminare i medicinali che non utilizza più. Questo aiuterà a proteggere l'ambiente.

6. Contenuto della confezione e altre informazioni

Cosa contiene VISUGLICAN

VISUGLICAN 40mg/ml + 2mg/ml Collirio, soluzione - flacone

I principi attivi sono sodio cromoglicato e clorfenamina maleato.

100 ml di collirio, soluzione contengono 4 g di sodio cromoglicato e 0,2 g clorfenamina maleato.

Gli altri componenti sono: sodio edetato, fosfato bisodico, fosfato monosodico, acqua depurata.

VISUGLICAN 40mg/ml + 2mg/ml Collirio, soluzione - contenitori monodose

I principi attivi sono sodio cromoglicato e clorfenamina maleato.

100 ml di collirio, soluzione contengono 4 g di sodio cromoglicato e 0,2 g clorfenamina maleato.

Gli altri componenti sono: sodio edetato, fosfato bisodico, fosfato monosodico, acqua per preparazioni iniettabili.

Descrizione dell'aspetto di VISUGLICAN e contenuto della confezione

VISUGLICAN Collirio si presenta in forma di soluzione, in confezioni da:

1 Flacone da 10 ml

25 Contenitori monodose da 0,5 ml

Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio

VISUFARMA S.p.A.

Via Alberto Cadlolo, 21

00136 Roma - Italia

Produttore

VISUGLICAN Collirio, soluzione in confezione da 1 Flacone da 10 ml:

Tubilux Pharma S.p.A.

Via Costarica, 20-22 Pomezia (Roma)

VISUGLICAN Collirio, soluzione in confezione da 25 Contenitori monodose da 0,5 ml:
C.O.C. Farmaceutici S.R.L.
Via Modena, 15
Sant'Agata Bolognese (BO).

Questo foglio illustrativo è stato aggiornato il:

Agenzia Italiana del Farmaco