

Ubimaior 50 mg capsule rigide

Ubidecarenone

Legga attentamente questo foglio prima di prendere questo medicinale perché contiene importanti informazioni per lei.

- Conservi questo foglio. Potrebbe aver bisogno di leggerlo di nuovo.
- Se ha qualsiasi dubbio, si rivolga al medico o al farmacista.
- Questo medicinale è stato prescritto soltanto per lei. Non lo dia ad altre persone, anche se i sintomi della malattia sono uguali ai suoi, perché potrebbe essere pericoloso.
- Se si manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista. Vedere paragrafo 4.

Contenuto di questo foglio:

1. Cos'è Ubimaior e a cosa serve
2. Cosa deve sapere prima di prendere Ubimaior
3. Come prendere Ubimaior
4. Possibili effetti indesiderati
5. Come conservare Ubimaior
6. Contenuto della confezione e altre informazioni

1. Cos'è Ubimaior e a cosa serve

Ubimaior è un medicinale a base di ubidecarenone (coenzima Q10).

Ubimaior è indicato nei soggetti che soffrono dalla nascita di una carenza del coenzima Q10.

2. Cosa deve sapere prima di prendere Ubimaior

Non prenda Ubimaior

- se è allergico all'ubidecarenone o ad uno qualsiasi degli altri componenti di questo medicinale (elencati al paragrafo 6).

Avvertenze e precauzioni

Si rivolga al medico o al farmacista prima di prendere Ubimaior.

Altri medicinali e Ubimaior

Informi il medico o il farmacista se sta assumendo, ha recentemente assunto o potrebbe assumere qualsiasi altro medicinale.

Gravidanza e allattamento

Se è in corso di gravidanza, se sospetta o sta pianificando una gravidanza, o se sta allattando con latte materno, chieda consiglio al medico o al farmacista prima di prendere questo medicinale.

Gravidanza

Durante i primi tre mesi di gravidanza prenda questo medicinale solo in caso di effettiva necessità e sotto diretto controllo del medico.

Guida di veicoli e utilizzo di macchinari

Ubimaior non altera la capacità di guidare veicoli o di usare macchinari.

Ubimaior contiene lattosio

Questo medicinale contiene lattosio (zucchero del latte). Se il medico le ha diagnosticato una intolleranza ad alcuni zuccheri, lo contatti prima di prendere questo medicinale.

3. Come prendere Ubimaior

Prenda questo medicinale seguendo sempre esattamente le istruzioni del medico che le indicherà la dose corretta. Se ha dubbi consulti il medico o il farmacista.

La dose consigliata è di una capsula al giorno, salvo diversa prescrizione del medico.

Se prende più Ubimaior di quanto deve

Se assume accidentalmente dosi eccessive di Ubimaior si rivolga al medico.

Se dimentica di prendere Ubimaior

Non prenda una dose doppia per compensare la dimenticanza della capsula.

Se interrompe il trattamento con Ubimaior

Se ha qualsiasi dubbio sull'uso di questo medicinale si rivolga al medico o al farmacista.

4. Possibili effetti indesiderati

Come tutti i medicinali, questo medicinale può causare effetti indesiderati sebbene non tutte le persone li manifestino. Il rispetto delle istruzioni contenute nel presente foglio illustrativo riduce il rischio di effetti indesiderati.

Se durante il trattamento con Ubimaior manifesta i seguenti effetti indesiderati, **INTERROMPA** il trattamento e consulti il medico:

Effetti che riguardano la pelle

- lesioni della pelle (eruzioni cutanee).

Effetti che riguardano lo stomaco e l'intestino

- disturbi allo stomaco;
- riduzione dell'appetito;
- nausea;
- diarrea.

Segnalazione degli effetti indesiderati

Se manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista. Può inoltre segnalare gli effetti indesiderati direttamente tramite il sistema nazionale di segnalazione al sito web <https://www.aifa.gov.it/content/segnalazioni-reazioni-avverse>.

Segnalando gli effetti indesiderati può contribuire a fornire maggiori informazioni sulla sicurezza di questo medicinale.

5. Come conservare Ubimaior

Conservi questo medicinale fuori dalla vista e dalla portata dei bambini.

Questo medicinale non richiede alcuna condizione particolare di conservazione. Conservare nella confezione originale per tenerlo al riparo dalla luce.

Non prenda questo medicinale dopo la data di scadenza che è riportata sulla scatola dopo la scritta SCAD. La data di scadenza si riferisce all'ultimo giorno di quel mese. Tale data si intende per il prodotto in confezionamento integro, correttamente conservato.

Non getti alcun medicinale nell'acqua di scarico e nei rifiuti domestici. Chiedere al farmacista come eliminare i medicinali che non utilizza più. Questo aiuterà a proteggere l'ambiente.

6. Contenuto della confezione e altre informazioni

Cosa contiene Ubimaior

- il principio attivo è: Ubidecarenone (50 mg per capsula)
- gli altri componenti sono: **Lattosio** (vedere paragrafo "Ubimaior contiene lattosio"), Polivinilpirrolidone insolubile, Polivinilpirrolidone, Talco, Silice colloidale idrata, Sodio laurilsolfato, Magnesio stearato, Eritrosina (E127), Ossido di ferro (E172), Biossido di titanio (E171), Gelatina.

Descrizione dell'aspetto di Ubimaior e contenuto della confezione

Ubimaior 50 mg capsule rigide confezionate in blister da 14 capsule.

Titolare dell'Autorizzazione all'Immissione in Commercio e produttore

Titolare dell'Autorizzazione all'Immissione in Commercio

CHIESI FARMACEUTICI S.p.A.

Via Palermo 26/A – 43122 Parma

Produttore

Doppel Farmaceutici S.r.l., via Volturmo, 48 – Quinto De Stampi - Rozzano (MI)

Questo foglio illustrativo è stato aggiornato il Gennaio 2022