

PRIMA DELL'USO
LEGGETE CON ATTENZIONE TUTTE LE INFORMAZIONI CONTENUTE
NEL FOGLIO ILLUSTRATIVO

Questo è un medicinale di AUTOMEDICAZIONE che potete usare per curare disturbi lievi e transitori facilmente riconoscibili e risolvibili senza ricorrere all'aiuto del medico. Può essere quindi acquistato senza ricetta ma va usato correttamente per assicurarne l'efficacia e ridurre gli effetti indesiderati.

- per maggiori informazioni e consigli rivolgetevi al farmacista
- consultate il medico se il disturbo non si risolve dopo un breve periodo di trattamento

CORYFIN TOSSE SEDATIVO
15 Mg/5 Ml sciroppo Flacone 150 Ml
Dropropizina

Composizione

Ogni flacone di sciroppo contiene:

Principio attivo:

Dropropizina mg 450

Ogni ml di sciroppo contiene:

Principio attivo:

Dropropizina mg 3

Eccipienti:

Acido benzoico, Acido citrico, Aroma di Ribes, Aroma di Amarena, Saccarosio, p-ossibenzoato di metile, Acqua depurata.

Come si presenta

- CORYFIN TOSSE SEDATIVO sciroppo si presenta in forma di sciroppo per uso orale. Il contenuto della confezione è di 150 ml.

Che cosa è

CORYFIN TOSSE SEDATIVO è un sedativo della tosse.

Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio

Laboratorio Farmaceutico SIT S.r.l. Via Cavour, 70 - 27035 Mede (PV)

Prodotto e controllato da

AEFFE FARMACEUTICI S.r.l. - Via Torino 448 - 10032 Brandizzo (TO)

Perché si usa

CORYFIN TOSSE SEDATIVO si usa come sedativo della tosse.

Quando non deve essere usato

In pazienti con ipersecrezione (aumento delle secrezioni) bronchiale e con ridotta funzionalità mucociliare (cioè ridotta capacità di eliminazione delle secrezioni da parte della mucosa bronchiale).

Ipersensibilità verso i componenti o altre sostanze strutturalmente correlate dal punto di vista chimico.

Gravidanza ed allattamento (vedere: Cosa fare durante la gravidanza e l'allattamento)

Quando può essere usato solo dopo aver consultato il medico

- Bambini di età inferiore ai 6 anni (vedere: E' importante sapere che)
- Pazienti con insufficienza renale grave (vedere: E' importante sapere che)

Cosa fare durante la gravidanza e l'allattamento

CORYFIN TOSSE SEDATIVO non deve essere usato nel primo trimestre di gravidanza e nell'allattamento. L'uso va anche evitato nel caso sospettiate uno stato di gravidanza o desideriate pianificare una maternità

Precauzioni per l'uso

Non previste

Quali medicinali o alimenti possono modificare l'effetto del medicinale

Non sono note interazioni con altri farmaci, tuttavia se state usando altri medicinali chiedete consiglio al vostro medico o farmacista.

E' importante sapere che

Nei bambini di età inferiore ai 6 anni e nei pazienti con insufficienza renale grave CORYFIN TOSSE SEDATIVO deve essere usato solo dopo aver consultato il medico ed aver valutato con lui il rapporto rischio/beneficio nel proprio caso

Poiché il prodotto può causare sonnolenza, deve essere fatta particolare attenzione nella guida di veicoli e nella manovra di macchinari che richiedano integrità del grado di vigilanza.

Come usare questo medicinale

Quanto

Scioppo: bambini da 6 mesi a un anno: ¼ di cucchiaino da tè 3 - 4 volte al dì.

bambini da 1 a 3 anni: ½ cucchiaino da tè 3 - 4 volte al dì.

bambini da 3 a 13 anni: 1 cucchiaino da tè 3 - 4 volte al dì.

ragazzi oltre i 13 anni e adulti: 2 cucchiaini da tè 3 - 4 volte al dì.

Un cucchiaino da tè (5 ml) corrisponde a 15 mg di sostanza attiva.

Attenzione: Non superare le dosi indicate senza il consiglio del medico

Quando e per quanto tempo

Attenzione: usare solo per brevi periodi di trattamento

Consultate il medico se il disturbo si presenta ripetutamente o se avete notato un qualsiasi cambiamento recente delle sue caratteristiche

Cosa fare se avete preso una dose eccessiva di medicinale

In caso di ingestione accidentale di una dose eccessiva di CORYFIN TOSSE SEDATIVO avvertite immediatamente il medico o rivolgetevi al più vicino ospedale.

Effetti indesiderati

Raramente sono stati segnalati nausea ed altri lievi disturbi gastrointestinali, spossatezza e/o torpore, cefalea e vertigini. Questi effetti indesiderati sono generalmente transitori. Quando si presentano è tuttavia opportuno consultare il medico o il farmacista.

Il rispetto delle istruzioni contenute nel foglio illustrativo riduce il rischio di effetti indesiderati.

E' importante comunicare al medico o al farmacista la comparsa di effetti indesiderati non descritti nel foglio illustrativo.

Richiedere e compilare la scheda di segnalazione degli Effetti Indesiderati disponibile in farmacia (modello B).

Scadenza e conservazione

Attenzione non utilizzare il medicinale dopo la data di scadenza indicata sulla confezione.

Tenere il medicinale fuori dalla portata dei bambini

E' importante avere sempre a disposizione le informazioni sul medicinale, pertanto conservate sia la scatola che il foglio illustrativo.

Revisione del Foglio illustrativo da parte dell'Agenzia Italiana del Farmaco: