

LENIDENT ZETA

Gocce odontalgiche 3,5 g 6 ml

**PRIMA DELL'USO LEGGETE CON ATTENZIONE TUTTE LE INFORMAZIONI
CONTENUTE NEL FOGLIO ILLUSTRATIVO**

Questo è un medicinale di AUTOMEDICAZIONE che potete usare per curare disturbi lievi e transitori facilmente riconoscibili e risolvibili senza ricorrere all'aiuto del medico.

Può essere quindi acquistato senza ricetta ma va usato correttamente per assicurarne l'efficacia e ridurre gli effetti indesiderati.

- per maggiori informazioni e consigli rivolgetevi al farmacista
- consultate il medico se il disturbo non si risolve dopo un breve periodo di trattamento.

**LENIDENT ZETA
Procaina cloridrato****Composizione:**

1 ml di soluzione contiene:

Principio attivo

Procaina cloridrato: 20 mg

Eccipienti: Etanolo, Glicole propilenico, Chiodi di garofano essenza, Fenolo, Acqua deionizzata.

Come si presenta:

LENIDENT ZETA si presenta in forma di soluzione dentale. Il contenuto della confezione è di un flaconcino da 6 ml con spargiliquido, contenente 3,5 g di prodotto.

Che cosa è: LENIDENT ZETA è una soluzione per il trattamento orale locale (ATC: A01AD11).

Titolare dell'Autorizzazione all'Immissione in Commercio:

ZETA FARMACEUTICI S.p.A. - Via Mentana n° 38 - 36100 Vicenza

Produttore e Controllore finale:

ZETA FARMACEUTICI S.p.A., Via Galvani n°10, 36066 Sandrigo (VI)

Perché si usa:

LENIDENT ZETA è un anestetico locale, analgesico per il mal di denti dovuto a carie, pulpopatie e periodontiti.

LENIDENT ZETA

Gocce odontalgiche 3,5 g 6 ml

Quando non deve essere usato:

Ipersensibilità verso i componenti o altre sostanze strettamente correlate dal punto di vista chimico.

Quando può essere usato solo dopo aver consultato il medico:

Nei bambini di età inferiore ai sei anni LENIDENT ZETA deve essere usato solo dopo aver consultato il medico ed aver valutato con lui il rapporto rischio/beneficio nel proprio caso.

Cosa fare durante la gravidanza e l'allattamento:

LENIDENT ZETA può essere utilizzato durante la gravidanza e l'allattamento.

Precauzioni per l'uso

Dopo breve periodo di trattamento senza risultati apprezzabili, consultare il Medico.

Quali medicinali o alimenti possono modificare l'effetto del medicinale

Non sono state riportate interazioni con altri medicinali o di altro genere. Se state usando altri medicinali chiedete consiglio al vostro medico o farmacista.

È importante sapere che

Nei bambini di età inferiore ai sei anni LENIDENT ZETA deve essere usato solo dopo aver consultato il medico ed aver valutato con lui il rapporto rischio/beneficio nel proprio caso.

L'uso, specie se prolungato, di prodotti per uso topico può dare origine a fenomeni di sensibilizzazione. Qualora dovessero verificarsi, sospendere l'applicazione del preparato e consultare il medico.

Note di educazione sanitaria:

Per prevenire l'insorgenza di mal di denti causato da carie, pulpopatie e periodontiti si consiglia una appropriata igiene dei denti e delle gengive e una corretta prevenzione mediante il periodico controllo da uno specialista.

Si può fare ricorso a LENIDENT ZETA nei casi di medicazione occasionale e sintomatica d'urgenza dei dolori acuti dentali causati da carie, pulpopatie e periodontiti.

Come usare questo medicinale**Quanto, quando e per quanto tempo**

1 o 2 gocce al bisogno o secondo prescrizione medica.

Attenzione: non superare le dosi indicate senza il consiglio del medico.

Module 1.3.1

Ed. 00 – October 2009

Pag. 2/3

LENIDENT ZETA

Gocce odontalgiche 3,5 g 6 ml

Attenzione: usare solo per brevi periodi di trattamento.

Consultate il medico se il disturbo si presenta ripetutamente o se avete notato un qualsiasi cambiamento recente delle sue caratteristiche.

Come:

Spruzzare le gocce direttamente nella cavità cariata.

Cosa fare se avete preso una dose eccessiva di medicinale:

Non sono noti casi di sovradosaggio.

In caso di assunzione accidentale di una dose eccessiva di LENIDENT ZETA avvertire immediatamente il medico o rivolgetevi al più vicino ospedale.

Effetti indesiderati

Non sono stati riportati effetti indesiderati. Il rispetto delle istruzioni contenute nel foglio illustrativo riduce il rischio di effetti indesiderati.

Questi effetti indesiderati sono generalmente transitori. Quando si presentano è tuttavia opportuno consultare il medico o il farmacista.

È importante comunicare al medico o al farmacista la comparsa di effetti indesiderati non descritti nel foglio illustrativo.

Richiedere e compilare la scheda di segnalazione degli Effetti Indesiderati disponibile in farmacia (modello B).

Scadenza e conservazione

Attenzione: non utilizzare il medicinale dopo la data di scadenza indicata sulla confezione.

Non usare il prodotto se la confezione presenta segni visibili di deterioramento.

Tenere il medicinale fuori dalla portata dei bambini.

È importante avere sempre a disposizione le informazioni sul medicinale, pertanto conservate sia la scatola che il foglio illustrativo.

Revisione del foglio illustrativo da parte del Ministero della Sanità:

Settembre 2005