

Foglio illustrativo: informazioni per il paziente

TIROULAR 4% collirio, soluzione

Acetilcisteina

Legga attentamente questo foglio prima di usare questo medicinale perchè contiene importanti informazioni per lei.

Usi questo medicinale sempre come esattamente descritto in questo foglio o come il medico le ha detto di fare.

- Conservi questo foglio. Potrebbe aver bisogno di leggerlo di nuovo.
- Se desidera maggiori informazioni o consigli, si rivolga al farmacista
- Se si manifesta uno qualsiasi degli effetti indesiderati, tra cui effetti non elencati in questo foglio, si rivolga al medico, o al farmacista. Vedere paragrafo 4.
- Si rivolga al medico se non nota miglioramenti o se nota un peggioramento dei sintomi dopo un breve periodo di tempo.

Contenuto di questo foglio:

1. Cos'è TIROULAR 4% collirio e a cosa serve
2. Cosa deve sapere prima di usare TIROULAR 4% collirio
3. Come usare TIROULAR 4% collirio
4. Possibili effetti indesiderati
5. Come conservare TIROULAR 4% collirio
6. Contenuto della confezione e altre informazioni

1. Cos'è TIROULAR 4% collirio e a cosa serve

TIROULAR è indicato per il trattamento dei disturbi dell'occhio causati dalla diminuzione della secrezione lacrimale, con e senza l'alterazione delle mucose di rivestimento dell'occhio, quali: cheratocongiuntivite secca, affezioni della cornea da diminuzione della lacrimazione, cheratopatie a diversa eziologia e ulcere della cornea.

2. Cosa deve sapere prima di usare TIROULAR 4% collirio

Non usi TIROULAR 4% collirio

- se è allergico al principio attivo o ad uno qualsiasi degli altri componenti di questo medicinale (elencati al paragrafo 6).

Avvertenze e precauzioni

Si rivolga al medico o al farmacista prima di usare TIROULAR 4% collirio.

È consigliato di non impiegare lenti a contatto morbide in corso di terapia con TIROULAR, perché possono accumulare il conservante contenuto nella soluzione.

Altri medicinali e TIROULAR 4% collirio

Non si conoscono effetti d'interazione con altri medicinali nel caso di applicazione diretta sull'occhio.

Informi il medico o il farmacista se sta assumendo, ha recentemente assunto, o potrebbe assumere qualsiasi altro medicinale.

TIROULAR 4% collirio con cibi, bevande e alcol

Non pertinente.

Gravidanza e allattamento

Se è in corso una gravidanza, se sospetta o sta pianificando una gravidanza, o se sta allattando con latte materno chieda consiglio al medico o al farmacista prima di usare questo medicinale. Non ci sono prove che sconsiglino l'uso di TIROULAR durante la gravidanza e l'allattamento.

Guida di veicoli e utilizzo di macchinari

TIROULAR non compromette la capacità di guidare veicoli o di usare macchinari. Tuttavia eviti di usare TIROULAR se guida un veicolo, o se usa un macchinario.

TIROULAR 4% collirio, soluzione contiene benzalconio cloruro

Questo medicinale contiene 1,42 microgrammi di benzalconio cloruro per goccia equivalente a 0,05 mg/ml. Benzalconio cloruro può essere assorbito dalle lenti a contatto morbide e può portare al cambiamento del loro colore. Tolga le lenti a contatto prima di usare questo medicinale e aspetti 15 minuti prima di riapplicarle.

Benzalconio cloruro può anche causare irritazione agli occhi specialmente se ha l'occhio secco o disturbi alla cornea (lo strato trasparente più superficiale dell'occhio). Se prova una sensazione anomala all'occhio, di bruciore o dolore dopo aver usato questo medicinale, parli con il medico.



3. Come usare TIROULAR 4% collirio

Usi questo medicinale seguendo sempre esattamente quanto riportato in questo foglio o le istruzioni del medico o del farmacista. Se ha dubbi consulti il medico o il farmacista.

La dose raccomandata è: 1-2 gocce all'interno dell'occhio, sollevando leggermente le palpebre, per 3-4 volte al giorno, secondo prescrizione medica.

Per somministrare

- rimuovere la ghiera a strappo totale
- rimuovere il tappo in gomma
- togliere dall'involucro l'apposito contagocce, e calzarlo sull'imboccatura del flacone (Fig. 1)
- togliere il tappo del contagocce e somministrare le gocce (Fig. 2).



Uso nei bambini

Non esiste alcuna indicazione per un uso specifico di TIROULAR 4% nella popolazione pediatrica.

Se usa più TIROULAR 4% collirio di quanto deve

Non sono previste conseguenze clinicamente significative.

Se dimentica di usare TIROULAR 4% collirio

Non usi una dose doppia per compensare la dimenticanza della dose.

4. Possibili effetti indesiderati

Come tutti i medicinali, questo medicinale può causare effetti indesiderati sebbene non tutte le persone li manifestino.

Sono possibili irritazioni transitorie localizzate e in soggetti molto reattivi fenomeni di sensibilizzazione che richiedono l'interruzione del trattamento.

Segnalazione degli effetti indesiderati

Se manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista. Può inoltre segnalare gli effetti indesiderati direttamente tramite il sistema nazionale di segnalazione all'indirizzo <https://www.aifa.gov.it/content/segnalazioni-reazioni-avverse>.

Segnalando gli effetti indesiderati può contribuire a fornire maggiori informazioni sulla sicurezza di questo medicinale.

5. Come conservare TIROCLAR 4% collirio

Conservi questo medicinale fuori dalla vista e dalla portata dei bambini.

Questo medicinale non richiede alcuna condizione particolare di conservazione. Dopo l'apertura della confezione, il collirio può essere utilizzato per un periodo di tempo non superiore a tre settimane. Si raccomanda di richiudere immediatamente il flacone dopo ogni singola applicazione.

Non usi questo medicinale dopo la data di scadenza che è riportata sulla scatola e sul flacone dopo Scad. La data di scadenza si riferisce all'ultimo giorno di quel mese.

Non getti alcun medicinale nell'acqua di scarico o nei rifiuti domestici. Chiedi al farmacista come eliminare i medicinali che non utilizzi più. Questo aiuterà a proteggere l'ambiente.

6. Contenuto della confezione e altre informazioni

Cosa contiene TIROCLAR 4% collirio

Il principio attivo è acetilcisteina. In 100 ml di soluzione sono disciolti 4 g.

Gli altri componenti sono alcool polivinilico, sodio edetato, sodio cloruro, potassio cloruro, benzalconio cloruro, sodio idrossido, acqua per preparazioni iniettabili.

Descrizione dell'aspetto di TIROCLAR 4% collirio e contenuto della confezione

Flacone in vetro ambrato contenente 10 ml di soluzione al 4% e contagocce.

Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio e produttore

OmniVision Italia S.r.l.
Via Montefeltro, 6
20156 Milano

Produttore

TUBILUX PHARMA S.p.A.
Via Costarica, 20/22
00071 Pomezia (ROMA)

Questo foglio illustrativo è stato aggiornato il