

Foglio illustrativo: informazioni per il paziente

MORELAC 10.000.000 UFC - 5.000.000 UFC - 4.000.000.000 UFC polvere per sospensione orale
Lactobacillus acidophilus P-18806, Lactobacillus delbrueckii P-18805 e Streptococcus thermophilus P-18807

Legga attentamente questo foglio prima di prendere questo medicinale perché contiene importanti informazioni per lei.

Prenda questo medicinale sempre come esattamente descritto in questo foglio o come il medico o farmacista le ha detto di fare.

- Conservi questo foglio. Potrebbe aver bisogno di leggerlo di nuovo.
- Se desidera maggiori informazioni o consigli, si rivolga al farmacista.
- Se si manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, inclusi quelli non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista. Vedere paragrafo 4.
- Si rivolga al medico se non nota miglioramenti o se nota un peggioramento dei sintomi dopo un breve periodo.

Contenuto di questo foglio:

1. Che cos'è MORELAC e a cosa serve
2. Cosa deve sapere prima di prendere MORELAC
3. Come prendere MORELAC
4. Possibili effetti indesiderati
5. Come conservare MORELAC
6. Contenuto della confezione e altre informazioni

1. Che cos'è MORELAC e a cosa serve

MORELAC contiene come principi attivi il *Lactobacillus acidophilus P-18806*, il *Lactobacillus delbrueckii P-18805* e lo *Streptococcus thermophilus P-18807*.

MORELAC è indicato in caso di alterazioni della flora batterica intestinale causate da sindromi diarroiche e dispeptiche (con digestione difficile), da enteriti e coliti (infiammazioni dell'intestino) e dall'uso di antibiotici (medicinali usati per il trattamento delle infezioni causate da batteri).

Si rivolga al medico se non si sente meglio o se si sente peggio dopo un breve periodo.

2. Cosa deve sapere prima di prendere MORELAC

Non prenda MORELAC

- Se è allergico ad uno qualsiasi dei componenti di questo medicinale (elencati al paragrafo 6);
- se ha o sospetta un'allergia alle proteine del latte (vedere "MORELAC contiene saccarosio, sorbitolo e lattosio" e "Avvertenze e precauzioni").

Avvertenze e precauzioni

Si rivolga al medico o al farmacista prima di prendere MORELAC.

Questo medicinale contiene proteine del latte. Se il medico le ha diagnosticato o sospetta un'allergia alle proteine del latte vaccino, lo contatti prima di prendere questo medicinale.

Bambini

Non ci sono dati disponibili sull'uso di questo medicinale nei bambini.

Altri medicinali e MORELAC

Informi il medico o il farmacista se sta assumendo, ha recentemente assunto o potrebbe assumere qualsiasi altro medicinale.

Prenda MORELAC almeno 3 ore dopo aver assunto medicinali usati per il trattamento delle infezioni causate da batteri (antibiotici). MORELAC contiene batteri sensibili a questo tipo di medicinali e quindi può perdere di efficacia.

Gravidanza e allattamento

Se è in corso una gravidanza, se sospetta o sta pianificando una gravidanza o se sta allattando con latte materno chieda consiglio al medico o al farmacista prima di prendere questo medicinale. MORELAC può essere assunto durante la gravidanza o l'allattamento con latte materno.

Guida di veicoli e utilizzo di macchinari

MORELAC non altera la capacità di guidare veicoli e di utilizzare macchinari.

MORELAC contiene saccarosio, sorbitolo e lattosio

Questo medicinale contiene saccarosio e lattosio. Se il medico le ha diagnosticato una intolleranza ad alcuni zuccheri, lo contatti prima di prendere questo medicinale.

Questo medicinale contiene 6 mg di sorbitolo per bustina.

Questo medicinale contiene meno di 1 mmol (23 mg) di sodio per bustina, cioè essenzialmente 'senza sodio'.

3. Come prendere MORELAC

Prenda questo medicinale seguendo sempre esattamente le istruzioni del medico o del farmacista. Se ha dubbi consulti il medico o il farmacista.

La dose raccomandata è 1-2 bustine al giorno.

Sciogla il contenuto della bustina in un poco di acqua, di acqua zuccherata o di latte.

Se prende più MORELAC di quanto deve

Non sono noti casi di sovradosaggio.

In caso di assunzione/ingestione accidentale di una dose eccessiva di MORELAC avverta immediatamente il medico o si rivolga al più vicino ospedale.

Se dimentica di prendere MORELAC

Non prenda una dose doppia per compensare la dimenticanza della bustina.

Se interrompe il trattamento con MORELAC

Se ha qualsiasi dubbio sull'uso di questo medicinale, si rivolga al medico o al farmacista.

4. Possibili effetti indesiderati

Come tutti i medicinali, questo medicinale può causare effetti indesiderati sebbene non tutte le persone li manifestino.

Non sono stati segnalati effetti indesiderati con l'uso di questo medicinale.

Segnalazione degli effetti indesiderati

Se manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista. Lei può inoltre segnalare gli effetti indesiderati direttamente tramite il sistema nazionale di segnalazione all'indirizzo <https://www.aifa.gov.it/content/segnalazioni-reazioni-avverse>

Segnalando gli effetti indesiderati lei può contribuire a fornire maggiori informazioni sulla sicurezza di questo medicinale.

5. Come conservare MORELAC

Conservi questo medicinale fuori dalla vista e dalla portata dei bambini.

Non prenda questo medicinale dopo la data di scadenza che è riportata sulla confezione dopo "Scad.". La data di scadenza si riferisce all'ultimo giorno di quel mese.

Conservare in frigorifero, tra +2°C e +8 °C. Il medicinale può essere conservato per brevi periodi a temperatura ambiente (25°C).

Non getti alcun medicinale nell'acqua di scarico e nei rifiuti domestici. Chieda al farmacista come eliminare i medicinali che non utilizza più. Questo aiuterà a proteggere l'ambiente.

6. Contenuto della confezione e altre informazioni

Cosa contiene MORELAC

- I principi attivi sono il *Lactobacillus acidophilus* P-18806, il *Lactobacillus delbrueckii* P-18805 e lo *Streptococcus thermophilus* P-18807. Ogni bustina contiene:
 - almeno 10.000.000 unità formanti colonie (UFC) di *Lactobacillus acidophilus* P-18806;
 - almeno 5.000.000 unità formanti colonie (UFC) di *Lactobacillus delbrueckii* P-18805;
 - almeno 4.000.000.000 unità formanti colonie (UFC) di *Streptococcus thermophilus* P-18807.
- Gli altri componenti sono: acido silicico, sodio saccarinato, aroma banana polvere, aroma albicocca polvere, maltodestrine, crioprotettore (latte scremato, saccarosio, sorbitolo, sodio ascorbato, Tween 80), lattosio.

Descrizione dell'aspetto di MORELAC e contenuto della confezione

Confezione da 10 bustine in accoppiato carta/Al/politene in astuccio di cartone litografato.

Titolare dell'Autorizzazione all'Immissione in Commercio e produttore

Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio

Proge Farm S.r.l. - Largo Donegani 4/A - 28100 Novara - Italia

Produttore

S.I.I.T. S.r.l. – Servizio Internazionale Imballaggi Termosaldanti – Via Ariosto, 50/60 – Trezzano sul Naviglio (MI) – Italia

Questo foglio illustrativo è stato aggiornato il: