

Foglio illustrativo: informazioni per l'utilizzatore

DISINFARM 0,1% soluzione cutanea

Benzalconio cloruro

Legga attentamente questo foglio prima di usare questo medicinale perché contiene importanti informazioni per lei.

Usi questo medicinale sempre come esattamente descritto in questo foglio o come il medico o il farmacista le ha detto di fare.

- Conservi questo foglio. Potrebbe aver bisogno di leggerlo di nuovo.
- Se desidera maggiori informazioni o consigli, si rivolga al farmacista.
- Se si manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, tra cui effetti non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista. Vedere paragrafo 4.
- Si rivolga al medico se non nota miglioramenti o se nota un peggioramento dei sintomi dopo alcuni giorni di trattamento.

Contenuto di questo foglio:

1. Cos'è DISINFARM e a cosa serve
2. Cosa deve sapere prima di usare DISINFARM
3. Come usare DISINFARM
4. Possibili effetti indesiderati
5. Come conservare DISINFARM
6. Contenuto della confezione e altre informazioni

1. Cos'è DISINFARM e a cosa serve

DISINFARM contiene il principio attivo benzalconio cloruro che appartiene ad un gruppo di medicinali chiamati antisettici e disinfettanti che riducono o bloccano la crescita dei batteri.

DISINFARM è indicato per pulire e disinfettare la pelle in caso di lesioni superficiali di piccole dimensioni (ferite, abrasioni, scottature [ustioni di primo grado]).

Si rivolga al medico se non si sente meglio o se si sente peggio dopo alcuni giorni di trattamento.

2. Cosa deve sapere prima di usare DISINFARM

Non usi DISINFARM

- se è allergico al benzalconio cloruro o ad uno qualsiasi degli altri componenti di questo medicinale (elencati al paragrafo 6).

Avvertenze e precauzioni

Si rivolga al medico o al farmacista prima di usare DISINFARM

Questo medicinale deve essere applicato solo sulla pelle (uso esterno).

Non applichi DISINFARM sugli occhi o nella parte interna dell'orecchio (orecchio medio).

Non ingerisca e non inali DISINFARM in quanto si possono verificare gravi conseguenze, anche mortali.

Dopo aver applicato questo medicinale sulla pelle, eviti di esporsi al sole o a lampade solari (sorgenti artificiali di raggi ultravioletti).

Il prodotto è infiammabile: non esponga il contenitore a fonti di calore e non lo spruzzi su fiamma o corpo incandescente.

Non usi questo medicinale per trattamenti prolungati. Dopo un breve periodo di trattamento, se non nota risultati, consulti il medico. Se usa DISINFARM, soprattutto per lunghi periodi di tempo, si possono manifestare reazioni allergiche (fenomeni di sensibilizzazione). In tal caso, interrompa il trattamento ed informi il medico che stabilirà una terapia idonea.

Altri medicinali e DISINFARM

Informi il medico o il farmacista se sta usando, ha recentemente usato o potrebbe usare qualsiasi altro medicinale.

Non utilizzi saponi (detergenti anionici) insieme a DISINFARM, perché l'effetto di questo medicinale è annullato dai saponi. Durante il trattamento con DISINFARM, eviti di usare altri medicinali simili (disinfettanti o detergenti).

Gravidanza e allattamento

Se è in corso una gravidanza, se sospetta o sta pianificando una gravidanza, o se sta allattando con latte materno chiedi consiglio al medico o al farmacista prima di usare questo medicinale.

Se è in stato di gravidanza e se sta allattando al seno, può usare questo medicinale.
Non applichi questo medicinale sul seno perché il bambino potrebbe ingerirlo con il suo latte.

Guida di veicoli e utilizzo di macchinari

DISINFARM non influenza la capacità di guidare veicoli o usare macchinari.

DISINFARM contiene etanolo

Questo medicinale contiene 100 mg di etanolo ogni 100 ml, che è equivalente a 0,1g/100ml.

Questo medicinale contiene essenza limone a sua volta contenente citrale, citronellolo, limonene, geraniolo, eugenolo, idrossicitronellale, linalolo.

Citrale, citronellolo, limonene, geraniolo, eugenolo, idrossicitronellale, linalolo possono causare reazioni allergiche.

3. Come usare DISINFARM

Usi questo medicinale seguendo sempre esattamente quanto riportato in questo foglio o le istruzioni del medico o del farmacista. Se ha dubbi consulti il medico o il farmacista.

Applichi la soluzione, senza diluirla, sulle ferite, direttamente oppure utilizzando una garza sterile.

Se necessario può ripetere l'operazione 2 o 3 volte al giorno.

Non superi le dosi consigliate e non applichi il medicinale sotto bendaggio o per impacchi.

Se usa più DISINFARM di quanto deve

Se utilizzato nelle condizioni normali indicate in questo foglio illustrativo, questo medicinale non comporta rischi di danni da sovradosaggio.

In caso di ingestione accidentale di DISINFARM avverta immediatamente il medico o si rivolga al più vicino ospedale.

L'ingestione o l'inalazione accidentale di alcuni disinfettanti può avere conseguenze gravi, talvolta fatali.

Se ha qualsiasi dubbio sull'uso di questo medicinale, si rivolga al medico o al farmacista.

4. Possibili effetti indesiderati

Come tutti i medicinali, questo medicinale può causare effetti indesiderati sebbene non tutte le persone li manifestino.

Si possono manifestare casi di intolleranza con sintomi quali bruciore o irritazione della pelle. Tali sintomi di solito non richiedono modifiche del trattamento. Questi effetti indesiderati sono generalmente transitori. Quando si presentano è tuttavia opportuno consultare il medico o il farmacista.

Segnalazione degli effetti indesiderati

Se manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio si rivolga al medico o al farmacista. Lei può inoltre segnalare gli effetti indesiderati direttamente tramite il sistema nazionale di segnalazione all'indirizzo www.aifa.gov.it/content/segnalazioni-reazioni-avverse. Segnalando gli effetti indesiderati lei può contribuire a fornire maggiori informazioni sulla sicurezza di questo medicinale.

5. Come conservare DISINFARM

Conservi questo medicinale fuori dalla vista e dalla portata dei bambini.

Non usi questo medicinale dopo la data di scadenza che è riportata sulla confezione dopo "Scad.". La data di scadenza si riferisce all'ultimo giorno di quel mese.

Conservare nella confezione originale per proteggere il medicinale dalla luce e dal calore.

Non getti alcun medicinale nell'acqua di scarico e nei rifiuti domestici. Chiedi al farmacista come eliminare i medicinali che non utilizzi più. Questo aiuterà a proteggere l'ambiente.

6. Contenuto della confezione e altre informazioni

Cosa contiene DISINFARM

- Il principio attivo è benzalconio cloruro. 100 g di soluzione contengono 0,10 g di benzalconio cloruro (cloruro di alchil – dimetil – benzil ammonio).
Gli altri componenti sono: acqua depurata, alcool etilico essenza limone a sua volta contenente citrale, citronellolo, limonene, geraniolo, eugenolo, idrossicitronellale, linalolo.
- ~~Citral~~

Descrizione dell'aspetto di DISINFARM e contenuto della confezione

Flacone da 200 o 500 ml di soluzione cutanea.

Titolare dell'Autorizzazione all'Immissione in Commercio

AEFFE FARMACEUTICI Srl –
[Via Carlo Porta, 49 – 20064 Gorgonzola \(MI\)](#)
[Piazza Sant'Angelo 1 – Milano](#)

Produttori Responsabili del Rilascio dei Lotti

AEFFE FARMACEUTICI Srl – Via Torino, 448 – Brandizzo (TO)

Concessionario esclusivo di vendita:

Farmakopea S.p.A. – Via Aldo Moro, 11 – 20080 Carpiano (MI)

Questo foglio illustrativo è stato aggiornato il:

Formattato: Tipo di carattere: (Predefinito)
TimesNew Roman

Formattato: Normale, Interlinea singola,
Nessun elenco puntato o numerato