

Foglio illustrativo: informazioni per l'utilizzatore

LENIL ANTIMICOTICO 10 mg/g crema

Legga attentamente questo foglio prima di usare questo medicinale perché contiene importanti informazioni per lei.

Usi questo medicinale sempre come esattamente descritto in questo foglio o come il medico o farmacista le ha detto di fare.

- Conservi questo foglio. Potrebbe aver bisogno di leggerlo di nuovo.
- Se desidera maggiori informazioni o consigli, si rivolga al farmacista.
- Se si manifesta uno qualsiasi degli effetti indesiderati, tra cui effetti non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista. Vedere paragrafo 4.
- Si rivolga al medico se non nota miglioramenti o se nota un peggioramento dei sintomi dopo 3-4 settimane.

Contenuto di questo foglio:

1. Cos'è LENIL ANTIMICOTICO e a cosa serve
2. Cosa deve sapere prima di usare LENIL ANTIMICOTICO
3. Come usare LENIL ANTIMICOTICO
4. Possibili effetti indesiderati
5. Come conservare LENIL ANTIMICOTICO
6. Contenuto della confezione e altre informazioni

1. Cos'è LENIL ANTIMICOTICO e a cosa serve

LENIL ANTIMICOTICO contiene il principio attivo clotrimazolo, appartenente ad un gruppo di medicinali chiamati antimicotici, attivo contro la crescita dei funghi.

Questo medicinale è indicato per il trattamento delle infezioni della pelle e delle pieghe della pelle, causate da funghi (micosi), come pitiriasi versicolor, candidosi cutanea, tinea pedis o piede d'atleta, tinea corporis.

2. Cosa deve sapere prima di usare LENIL ANTIMICOTICO

Non usi LENIL ANTIMICOTICO

- se è allergico al clotrimazolo o ad uno qualsiasi degli altri componenti di questo medicinale (elencati al paragrafo 6).

Avvertenze e precauzioni

Si rivolga al medico o al farmacista prima di usare LENIL ANTIMICOTICO.

Si rivolga al medico se ha già sofferto in passato di questi disturbi (recidive di micosi).

Non ingerisca la crema ed eviti il contatto con gli occhi.

L'uso di LENIL ANTIMICOTICO, soprattutto se per periodi prolungati, può causare reazioni di tipo allergico (sensibilizzazione) quali eritema (rossore localizzato nella zona della pelle dove viene applicato il medicinale) e prurito. In questo caso, è necessario interrompere il trattamento e rivolgersi al medico o al farmacista.

Informi il medico se non nota miglioramenti dopo 3-4 settimane o se manifesta un peggioramento o la ricomparsa dei sintomi (recidive).

Bambini

Se l'infezione della pelle è nella zona del pannolino (dermatite da pannolino), non è raccomandato utilizzare un pannolino non traspirante (ad effetto "occlusivo") dopo aver applicato la crema.

Altri medicinali e LENIL ANTIMICOTICO

Informi il medico o il farmacista se sta usando, ha recentemente usato o potrebbe usare qualsiasi altro medicinale.

Non sono noti medicinali che possano modificare l'effetto di LENIL ANTIMICOTICO.

LENIL ANTIMICOTICO con il cibo

Non sono noti alimenti che possano modificare l'effetto di LENIL ANTIMICOTICO.

Gravidanza e allattamento

Se è in corso una gravidanza, se sospetta o sta pianificando una gravidanza, o se sta allattando con latte materno chieda consiglio al medico o al farmacista prima di usare questo medicinale.

Gravidanza

Se è nei primi tre mesi di gravidanza, deve essere consultato il medico prima di usare LENIL ANTIMICOTICO.

Allattamento

LENIL ANTIMICOTICO può essere utilizzato durante l'allattamento. Se usato localmente sulla zona del capezzolo, lavare il seno prima di allattare il bambino.

Guida di veicoli e utilizzo di macchinari

Questo medicinale non altera o altera in modo trascurabile la capacità di guidare veicoli o di usare macchinari.

LENIL ANTIMICOTICO contiene alcol cetostearilico, alcol benzilico, polisorbato 60

Questo medicinale contiene **alcol cetostearilico** che può causare reazioni sulla pelle localizzate (ad es. dermatiti da contatto).

Questo medicinale contiene 10 mg/g di **alcol benzilico**. L'alcol benzilico può causare reazioni allergiche e lieve irritazione locale.

Questo medicinale contiene **polisorbato 60**. I polisorbati possono provocare reazioni allergiche.

3. Come usare LENIL ANTIMICOTICO

Usi questo medicinale seguendo sempre esattamente quanto riportato in questo foglio o le istruzioni del medico o del farmacista. Se ha dubbi consulti il medico o il farmacista.

Prima di usare questo medicinale, lavi e asciughi accuratamente la zona da trattare.

Applichi una piccola quantità di crema nella zona interessata, 2-3 volte al giorno, massaggiando leggermente per favorirne l'assorbimento.

Non applichi grandi quantità di prodotto, ad esempio mezzo centimetro di crema è sufficiente per trattare una zona delle dimensioni di una mano.

Attenzione: non superi le dosi indicate senza il consiglio del medico.

LENIL ANTIMICOTICO è indicato soprattutto per il trattamento di infezioni di zone della pelle prive di peli (glabre).

Durata del trattamento

In genere, la durata del trattamento è di tre-quattro settimane.

Per evitare la comparsa di nuove infezioni e al fine di consolidare i risultati terapeutici ottenuti, si raccomanda di proseguire il trattamento per almeno altre 2 settimane dopo la scomparsa dei sintomi.

Nel caso in cui dopo 3-4 settimane di impiego continuativo non nota risultati apprezzabili, consulti il medico.

Consulti il medico se il disturbo si presenta ripetutamente o se ha notato un qualsiasi cambiamento recente delle sue caratteristiche.

Note di educazione sanitaria

Per prevenire la micosi e la ricomparsa dell'infezione è utile seguire alcune norme di carattere igienico sanitario, quali:

- Eviti di camminare a piedi nudi nei luoghi pubblici come piscine, palestre, camere di albergo, etc.
- Se pratica sport utilizzi calzature traspiranti e comode, le cui solette plantari dovrebbero essere cambiate o lavate periodicamente.
- Limiti l'utilizzo di indumenti contenenti fibre sintetiche.
- Cambi frequentemente il pannolino al neonato per evitare il ristagno di urina o feci sulla pelle.
- Sottoponga cani e gatti a visita veterinaria prima di accoglierli nell'ambiente domestico.
- Osservi ulteriori precauzioni igieniche, come cambiare frequentemente la biancheria intima e gli asciugamani, tenere separati gli indumenti e lavarli ad elevata temperatura, qualora un membro della famiglia manifesti una micosi.

Se usa più LENIL ANTIMICOTICO di quanto deve

In caso di ingestione/assunzione accidentale di questo medicinale avverta immediatamente il medico o si rivolga al più vicino ospedale.

Non si prevede alcun rischio di intossicazione acuta dal momento che è poco probabile che la stessa si verifichi dopo la singola applicazione cutanea di una dose eccessiva (applicazione estesa in condizioni favorevoli all'assorbimento) o per involontaria assunzione orale. Non esiste un antidoto specifico.

Se dimentica di applicare LENIL ANTIMICOTICO

Non usi una dose doppia per compensare la dimenticanza della dose.

Continui il trattamento attenendosi alla dose prescritta dal medico.

Se ha qualsiasi dubbio sull'uso di questo medicinale, si rivolga al medico o al farmacista.

4. Possibili effetti indesiderati

Come tutti i medicinali, questo medicinale può causare effetti indesiderati sebbene non tutte le persone li manifestino.

Si possono manifestare i seguenti effetti indesiderati:

Frequenza non nota (la cui frequenza non può essere definita sulla base dei dati disponibili):

- **disturbi del sistema immunitario:** angioedema (gonfiore), reazione anafilattica, ipersensibilità;
- **patologie della cute e del tessuto sottocutaneo:** bolle, dermatite da contatto, eritema (arrossamento della pelle), parestesia, desquamazione della pelle (perdita di cellule dello strato più superficiale della pelle), prurito, eruzione cutanea, orticaria, dolore pungente della pelle, sensazione di bruciore della pelle;
- **patologie generali e condizioni relative alla sede di somministrazione:** irritazione al sito di applicazione, reazione al sito di applicazione, edema, dolore;
- **patologie vascolari:** ipotensione (pressione bassa), sincope;
- **patologie respiratorie, toraciche e mediastiniche:** dispnea (affanno).

Segnalazione degli effetti indesiderati

Se manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista. Può inoltre segnalare gli effetti indesiderati direttamente tramite il sistema nazionale di segnalazione all'indirizzo <https://www.aifa.gov.it/content/segnalazioni-reazioni-avverse>.

Segnalando gli effetti indesiderati può contribuire a fornire maggiori informazioni sulla sicurezza di questo medicinale.

5. Come conservare LENIL ANTIMICOTICO

Conservi questo medicinale fuori dalla vista e dalla portata dei bambini.

Non usi questo medicinale dopo la data di scadenza che è riportata sulla confezione dopo “Scad.”. La data di scadenza si riferisce all’ultimo giorno di quel mese. La data di scadenza si intende per il prodotto in confezionamento integro correttamente conservato.

Questo medicinale non richiede alcuna particolare condizione di conservazione.

Non getti alcun medicinale nell’acqua di scarico e nei rifiuti domestici. Chiedi al farmacista come eliminare i medicinali che non utilizzi più. Questo aiuterà a proteggere l’ambiente.

6. Contenuto della confezione e altre informazioni

Cosa contiene LENIL ANTIMICOTICO

- Il principio attivo è clotrimazolo. 1 g di crema contiene 10 mg di clotrimazolo.
- Gli altri componenti sono: sorbitano monostearato, **polisorbato 60**, spermaceti, **alcol cetostearilico**, 2-ottildodecanolo, **alcol benzilico**, acqua depurata.

Descrizione dell’aspetto di LENIL ANTIMICOTICO e contenuto della confezione

LENIL ANTIMICOTICO è una crema per uso cutaneo. La confezione contiene un tubo da 30 g.

Titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio

Zeta Farmaceutici S.p.A.

Via Mentana 38 - 36100 Vicenza

Produttore

Doppel Farmaceutici S.r.l., Via Martiri delle Foibe, 1 - 29016 Cortemaggiore (PC) - Italia

Questo foglio illustrativo è stato aggiornato il