

Foglio illustrativo: informazioni per il paziente

Allespray 1mg/ml spray nasale, soluzione azelastina cloridrato

Legga attentamente questo foglio prima di usare questo medicinale perché contiene importanti informazioni per lei.

- Usi questo medicinale sempre come esattamente descritto in questo foglio o come il medico o farmacista le ha detto di fare.
- Conservi questo foglio. Potrebbe aver bisogno di leggerlo di nuovo.
- Se desidera maggiori informazioni o consigli, si rivolga al farmacista.
- Se si manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, inclusi quelli non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista. Vedere paragrafo 4.
- Si rivolga al medico se non nota miglioramenti o se nota un peggioramento dei sintomi dopo breve periodo di trattamento.

Contenuto di questo foglio:

1. Cos'è Allespray e a cosa serve
2. Cosa deve sapere prima di usare Allespray
3. Come usare Allespray
4. Possibili effetti indesiderati
5. Come conservare Allespray
6. Contenuto della confezione e altre informazioni

1. Cos'è Allespray e a cosa serve

Allespray contiene il principio attivo azelastina cloridrato, che appartiene ad un gruppo di medicinali chiamati antistaminici.

Allespray è indicato negli **adulti** e nei **bambini dai sei anni** in poi per il trattamento a breve termine dei sintomi del raffreddore di natura allergica (rinite allergica).

Si rivolga al medico se non si sente meglio o se si sente peggio dopo un breve periodo di trattamento.

2. Cosa deve sapere prima di usare Allespray

Non usi Allespray

- se è allergico a azelastina cloridrato o ad uno qualsiasi degli altri componenti di questo medicinale (elencati al paragrafo 6)
- nei bambini di età inferiore ai 6 anni in gravidanza e allattamento (vedere sezione "Gravidanza e Allattamento")

Avvertenze e precauzioni

Si rivolga al medico o al farmacista prima di prendere Allespray. Consulti il medico se durante il trattamento nota una persistenza dei sintomi o un loro peggioramento.

Usi solo per brevi periodi di trattamento.

Bambini

Allespray **non** deve essere utilizzato nei bambini di età inferiore ai 6 anni.

Altri medicinali e Allespray

Informi il medico o il farmacista se sta assumendo, ha recentemente assunto o potrebbe assumere qualsiasi altro medicinale.

Non sono state osservate interazioni con altri medicinali somministrati contemporaneamente.

Gravidanza e allattamento

Non usi questo medicinale se è in corso di gravidanza, se sospetta o sta pianificando una gravidanza o se sta allattando con latte materno.

Guida di veicoli e utilizzo di macchinari

Allespray ha una lieve influenza sulla capacità di guidare veicoli e di usare macchinari.

In rari casi, possono manifestarsi affaticamento o capogiri dovuti alla malattia stessa o quando usa Allespray.

In questi casi, non guidi veicoli, né usi macchinari. È necessario che sia consapevole che il consumo di alcol può aumentare questi effetti.

3. Come usare Allespray

Usi questo medicinale seguendo sempre esattamente quanto riportato in questo foglio o le istruzioni del medico o del farmacista. Se ha dubbi consulti il medico o il farmacista.

La *dose raccomandata* negli adulti e bambini al di sopra dei 6 anni è uno spruzzo (0,14 mg) in ogni narice, 1 o 2 volte al giorno.

Il flaconcino da 10 ml assicura l'erogazione totale di 72 spruzzi.


Non superi le dosi indicate senza il consiglio del medico.

Modalità di somministrazione:


1. Rimuova il cappuccio protettivo



2. Solo quando lo sta usando per la prima volta, schiacci con forza più volte fino a quando compare lo spruzzo



3. Spruzzi un puff per narice **mantenendo la testa in posizione eretta**



4. Rimetta il cappuccio protettivo

Uso nei bambini

Non utilizzare nei bambini di età inferiore ai 6 anni.

Se usa più Allespray di quanto deve

In caso di ingestione accidentale di Allespray avverta immediatamente il medico o si rivolga al più vicino ospedale.

Se ha assunto dosi eccessive di Allespray potrebbe avere i seguenti sintomi: malessere, eccitamento, contrazioni involontarie dei muscoli, rilassamento fisico e mentale.

Se dimentica di usare Allespray

Non usi una dose doppia per compensare la dimenticanza della dose, ma continui il trattamento come indicato in questo foglio.

Se interrompe il trattamento con Allespray

Se ha qualsiasi dubbio sull'uso di questo medicinale, si rivolga al medico, o al farmacista.

4. Possibili effetti indesiderati

Come tutti i medicinali, questo medicinale può causare effetti indesiderati sebbene non tutte le persone li manifestino.

Durante il trattamento con questo medicinale potrebbe manifestare i seguenti effetti indesiderati generalmente transitori, se ciò dovesse accadere si rivolga al medico o al farmacista:

Effetto indesiderato comune (può interessare fino a 1 persona su 10)

- Disgeusia*

Effetto indesiderato non comune (può interessare fino a 1 persona su 100)

- Affaticamento
- Capogiro
- Nausea
- Irritazione della mucosa nasale con possibile modesto sanguinamento, bruciore e prurito nasale, starnuti.

Effetto indesiderato raro (può interessare fino a 1 persona su 1.000)

- Debolezza

Effetto indesiderato molto raro (può interessare fino a 1 persona su 10.000)

- Ipersensibilità

(È stata descritta una sensazione di sapore amaro, tipico del farmaco in sé, che può verificarsi soprattutto per una posizione non corretta del capo, rovesciato all'indietro, durante la somministrazione)*

Segnalazione degli effetti indesiderati

Se manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o, al farmacista. Lei può inoltre segnalare gli effetti indesiderati direttamente tramite il sistema nazionale di segnalazione all'indirizzo <https://www.aifa.gov.it/content/segnalazioni-reazioni-avverse>. Segnalando gli effetti indesiderati lei può contribuire a fornire maggiori informazioni sulla sicurezza di questo medicinale.

5. Come conservare Allespray

Tenere questo medicinale fuori dalla vista e dalla portata dei bambini.

Questo medicinale non richiede alcuna condizione particolare di conservazione. Non refrigerare e non congelare. Non utilizzare questo medicinale dopo sei mesi dalla prima apertura del flaconcino.

Non usi questo medicinale dopo la data di scadenza che è riportata sulla scatola dopo Scad. La data di scadenza si riferisce all'ultimo giorno di quel mese.

Non getti alcun medicinale nell'acqua di scarico e nei rifiuti domestici. Chieda al farmacista come eliminare i medicinali che non utilizza più. Questo aiuterà a proteggere l'ambiente.

6. Contenuto della confezione e altre informazioni

Cosa contiene Allespray

Un flacone da 10 ml di soluzione contiene

- Il principio attivo è: azelastina cloridrato (0,01g)
- Gli altri componenti sono: metilidrossipropilcellulosa, sodio edetato, acido citrico anidro, sodio fosfato dodecaidrato, sodio cloruro, acqua depurata.

Descrizione dell'aspetto di Allespray e contenuto della confezione

Allespray spray nasale si presenta in forma di soluzione.

Il contenuto della confezione è un flacone con nebulizzatore da 10 ml di soluzione.

Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio e produttore

Titolare

Cooper Consumer Health B.V.
Verrijn Stuartweg 60 – 1112 AX Diemen
(Paesi Bassi)

Produttori

Madaus GmbH
Lütticher Straße 5 - 53842 Troisdorf - Germania

Questo foglio illustrativo è stato aggiornato il

Agenzia Italiana del Farmaco