

Foglio illustrativo: informazioni per l'utilizzatore

Gaviscon Bruciore e Indigestione
500mg/213mg/325mg
sospensione orale gusto menta

Sodio alginato/ Sodio bicarbonato/ Calcio carbonato

Legga attentamente questo foglio prima di usare questo medicinale perché contiene importanti informazioni per lei.

Usi questo medicinale sempre come esattamente descritto in questo foglio o come il medico o il farmacista le ha detto di fare.

- Conservi questo foglio. Potrebbe aver bisogno di leggerlo di nuovo.
- Se desidera maggiori informazioni o consigli, si rivolga al farmacista.
- Se si manifesta uno qualsiasi degli effetti indesiderati, tra cui effetti non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista. Vedere paragrafo 4.
- **Si rivolga al medico se non nota miglioramenti o se nota un peggioramento dei sintomi dopo 7 giorni.**

Contenuto di questo foglio:

1. Cos'è Gaviscon Bruciore e Indigestione e a cosa serve
2. Cosa deve sapere prima di prendere Gaviscon Bruciore e Indigestione
3. Come prendere Gaviscon Bruciore e Indigestione
4. Possibili effetti indesiderati
5. Come conservare Gaviscon Bruciore e Indigestione
6. Contenuto della confezione e altre informazioni

1. COS'È GAVISCON BRUCIORE E INDIGESTIONE E A COSA SERVE

Gaviscon Bruciore e Indigestione sospensione orale gusto menta in bustine è una combinazione di due antiacidi (calcio carbonato e sodio bicarbonato) e di un alginato che agisce in due modi.

1. Neutralizzando l'eccesso di acido nello stomaco per alleviare il dolore e il fastidio.
2. Formando una barriera protettiva sul contenuto dello stomaco per calmare il bruciore nel suo torace fino a 4 ore.

Questo medicinale è indicato per il trattamento dei sintomi del reflusso gastro-esofageo correlati all'acidità, quali rigurgito acido, bruciore di stomaco ed indigestione, ad esempio dopo i pasti o durante la gravidanza.

2. COSA DEVE SAPERE PRIMA DI PRENDERE GAVISCON BRUCIORE E INDIGESTIONE

Non prenda Gaviscon Bruciore e Indigestione

- se è **allergico** ai principi attivi o ad uno qualsiasi degli altri componenti di questo medicinale (elencati al paragrafo 6).

Si rivolga al medico o al farmacista prima di usare Gaviscon Bruciore e Indigestione se:

- ha **gravi problemi renali**
- ha disturbi elettrolitici che causano **bassi livelli di fosfato** nel sangue (ipofosfatemia)
- soffre o ha sofferto di **malattie significative ai reni o al cuore**, in quanto alcuni sali possono interferire con queste malattie (si rivolga al medico riguardo il contenuto di sali)
- se sa di avere una **quantità ridotta di acido gastrico** nello stomaco, in quanto questo medicinale potrebbe essere meno efficace.

Così come per altri prodotti anticido, l'assunzione di Gaviscon Bruciore e Indigestione sospensione orale gusto menta in bustine può mascherare i sintomi di altre malattie pre-esistenti più gravi.

Se i sintomi persistono **dopo 7 giorni, consulti il medico.**

Bambini

Non dia questo medicinale a bambini al di sotto dei 12 anni di età senza il consiglio del medico.
Vi è il rischio che aumentino i livelli di sodio nel sangue (ipernatriemia) nei bambini che hanno problemi renali o che hanno un'inflammazione dello stomaco o dell'intestino (gastroenterite).

Altri medicinali e Gaviscon Bruciore e Indigestione

Non prenda questo medicinale entro due ore dall'assunzione di altri medicinali per via orale perché può interferire con l'azione di alcuni altri medicinali. Informi il medico o il farmacista se sta assumendo o ha recentemente assunto qualsiasi altro medicinale, inclusi quelli senza obbligo di prescrizione.

Gravidanza, allattamento e fertilità

Può prendere questo medicinale se è incinta o se sta allattando al seno o se sta pianificando una gravidanza. Come per tutti i medicinali, la durata del trattamento deve essere limitata il più possibile.

Informazioni importanti su alcuni componenti di Gaviscon Bruciore e Indigestione

Questo medicinale contiene metile paraidrossibenzoato (E218) e propile paraidrossibenzoato (E216) che possono causare reazioni allergiche (anche ritardate).

Contiene anche 127,88 mg (5,56 mmoli) di sodio per 10 ml/1 bustina. La dose massima giornaliera raccomandata di questo medicinale contiene 1023 mg di sodio (componente principale del sale da cucina). Questo equivale al 51,15% dell'assunzione massima giornaliera raccomandata con la dieta di un adulto. Chieda al suo medico o al farmacista se ha bisogno di Gaviscon Bruciore e Indigestione giornalmente per un lungo periodo, soprattutto se segue una dieta a basso contenuto di sodio.

Inoltre, questo medicinale contiene 130 mg (3,25 mmol) di calcio per dose. Si rivolga al medico prima di usare questo medicinale se ha calcoli renali o alti livelli di calcio nel sangue.

3. COME PRENDERE GAVISCON BRUCIORE E INDIGESTIONE

Usi questo medicinale seguendo sempre esattamente quanto riportato in questo foglio o le istruzioni del medico o del farmacista. Se ha dubbi consulti il medico o il farmacista.

Adulti, inclusi gli anziani e bambini da 12 anni in su: 10-20 ml (da 1 a 2 bustine) dopo i pasti e la sera prima di andare a letto, fino a quattro volte al giorno.

Bambini al di sotto dei 12 anni: deve essere somministrato solo su consiglio medico.

Se prende più Gaviscon Bruciore e Indigestione di quanto deve

Se prende più Gaviscon Bruciore e Indigestione di quanto deve è improbabile che questo le provochi danno. Tuttavia si può sentire gonfio. Consulti il suo medico se questo sintomo non passa.

Se dimentica di prendere Gaviscon Bruciore e Indigestione

Se dimentica una dose non è necessario raddoppiare la dose la volta successiva, continui a prenderlo come prima.

4. POSSIBILI EFFETTI INDESIDERATI

Come tutti i medicinali, questo medicinale può causare effetti indesiderati, sebbene non tutte le persone li manifestino.

Se si verificano questi effetti indesiderati smetta di prendere questo medicinale e consulti immediatamente un medico.

Molto raramente (meno di 1 paziente su 10.000) c'è la possibilità di una reazione allergica ai componenti del medicinale. I sintomi possono includere dolore addominale, diarrea, nausea, vomito, prurito della pelle, eruzione cutanea, prurito, capogiri, gonfiore di volto, labbra, lingua o gola, e difficoltà a respirare.

L'ingestione di grandi quantità di calcio carbonato, un componente di questo medicinale, può causare un aumento del pH del sangue (alcalosi), troppo calcio nel sangue (ipercalcemia), un'aumentata secrezione di acido nello stomaco, e costipazione. Questi sintomi si verificano normalmente a seguito di assunzione di dosi superiori rispetto alla dose raccomandata.

Segnalazione degli effetti indesiderati

Se manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista. Può inoltre segnalare gli effetti indesiderati direttamente tramite il sistema nazionale di segnalazione all'indirizzo <https://www.aifa.gov.it/content/segnalazioni-reazioni-avverse>

5. COME CONSERVARE GAVISCON BRUCIORE E INDIGESTIONE

Conservi questo medicinale fuori dalla vista e dalla portata dei bambini. Non usi questo medicinale dopo la data di scadenza che è riportata sull'astuccio e sulla bustina dopo Scad. (mese/anno). La data di scadenza si riferisce all'ultimo giorno di quel mese.

Non conservare a temperatura superiore a 30°C. **Non refrigerare o congelare.**

Non getti alcun medicinale nell'acqua di scarico e nei rifiuti domestici. Chiedi al farmacista come eliminare i medicinali che non utilizzi più. Questo aiuterà a proteggere l'ambiente.

6. CONTENUTO DELLA CONFEZIONE E ALTRE INFORMAZIONI

Cosa contiene Gaviscon Bruciore e Indigestione

I principi attivi sono sodio alginato, sodio bicarbonato e calcio carbonato. Ogni bustina da 10 ml contiene 500 mg di sodio alginato, 213 mg di sodio bicarbonato e 325 mg di calcio carbonato. Gli altri componenti sono carbomero 974P, metile paraidrossibenzoato (E218), propile paraidrossibenzoato (E216), saccarina sodica, aroma menta, sodio idrossido, acqua depurata.

Descrizione dell'aspetto di Gaviscon Bruciore e Indigestione e contenuto della confezione

Gaviscon Bruciore e Indigestione contiene una sospensione biancastra con odore e aroma di menta.

Gaviscon Bruciore e Indigestione è disponibile in confezioni contenenti 4, 12 e 24 bustine.

È possibile che non tutte le confezioni siano commercializzate.

Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio

Reckitt Benckiser Healthcare (Italia) S.p.A.
Via G. Spadolini, 7
20141 Milano

Produttore

Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited, Dansom Lane, Hull, UK, HU8 7DS

RB NL Brands B.V., Schiphol Boulevard 207, Schiphol 1118BH, Paesi Bassi

Questo medicinale è autorizzato negli Stati Membri dello Spazio Economico Europeo con le seguenti denominazioni:

Belgio: *Gaviscon Antizuur-Antireflux Unidose suspensie voor oraal gebruik/Gaviscon Antiacide-Antireflux Unidose suspension buvable/Gaviscon Antisäure-Antireflux Unidose Suspension zum Einnehmen*

Cipro: *Gaviscon Double Action Liquid Sachets*

Repubblica Ceca: *Gaviscon Duo Efekt Sáčky*

Danimarca: *Galieve Forte, oral suspension i brev*

Finlandia: *Galieve 500 mg/213 mg/325 mg oraalisuspensio, annospussi*

Germania: *Gaviscon Dual 500 mg / 213 mg / 325 mg Suspension zum Einnehmen im Beutel*

Grecia: *Gaviscon Double Action Liquid Sachets Peppermint Flavour*

Ungheria: *Gaviscon Forte borsmenta ízű belsőleges szuszpenzió tasakban*

Islanda: *Galieve Forte 500 mg/213 mg/325 mg mixtúra, dreifa í skammtapokum*

Irlanda: *Gaviscon Extra Liquid Sachets Peppermint Flavour Oral Suspension* sodium alginate 500mg/10ml, sodium bicarbonate 213mg/10ml, calcium carbonate 325mg/10ml

Italia: *Gaviscon Bruciore e Indigestione* 500 mg + 213 mg + 325 mg sospensione orale gusto menta

Lussemburgo: *Gaviscon Antiacide-Antireflux Unidose* suspension buvable

Olanda: *Gaviscon Duo sachets*, suspensie voor oraal gebruik

Norvegia: *Galieve Forte* 500 mg/213 mg/325 mg mikstur, suspensjon i dosepose med peppermyntesmak

Polonia: *Gaviscon Duo*

Portogallo: *Gaviscon Duefet* 500 mg + 213 mg + 325 mg Suspensão oral em saquetas

Slovenia: *Gaviscon Duo Efekt vrecká*

Svezia: *Galieve* 500 mg/213 mg/325 mg

Questo foglio illustrativo è stato aggiornato il:

Foglio illustrativo: informazioni per l'utilizzatore

Gaviscon Bruciore e Indigestione sospensione orale gusto menta

Sodio alginato/Sodio bicarbonato/Calcio carbonato

500 mg/213 mg/325 mg

Legga attentamente questo foglio prima di usare questo medicinale perché contiene importanti informazioni per lei.

Usi questo medicinale sempre come esattamente descritto in questo foglio o come il medico o il farmacista le ha detto di fare.

- Conservi questo foglio. Potrebbe aver bisogno di leggerlo di nuovo.
- Se desidera maggiori informazioni o consigli, si rivolga al farmacista.
- Se si manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista. Vedere paragrafo 4.
- **Si rivolga al medico se non nota miglioramenti o se nota un peggioramento dei sintomi dopo 7 giorni.**

Contenuto di questo foglio:

1. Cos'è Gaviscon Bruciore e Indigestione e a cosa serve
2. Cosa deve sapere prima di prendere Gaviscon Bruciore e Indigestione
3. Come prendere Gaviscon Bruciore e Indigestione
4. Possibili effetti indesiderati
5. Come conservare Gaviscon Bruciore e Indigestione
6. Contenuto della confezione e altre informazioni

1. COS'È GAVISCON BRUCIORE E INDIGESTIONE E A COSA SERVE

Gaviscon Bruciore e Indigestione è una combinazione di due antiacidi (calcio carbonato e sodio bicarbonato) e di un alginato che agisce in due modi.

3. Neutralizzando l'eccesso di acido nello stomaco per alleviare il dolore e il fastidio.
4. Formando una barriera protettiva sul contenuto dello stomaco per lenire il bruciore nel suo torace fino a 4 ore.

Questo medicinale è indicato per il trattamento dei sintomi del reflusso gastro-esofageo correlati all'acidità, quali rigurgito acido, bruciore di stomaco ed indigestione, ad esempio dopo i pasti o durante la gravidanza.

2. COSA DEVE SAPERE PRIMA DI PRENDERE GAVISCON BRUCIORE E INDIGESTIONE

Non prenda Gaviscon Bruciore e Indigestione

- se è allergico ai principi attivi o ad uno qualsiasi degli altri componenti di questo medicinale (elencati al paragrafo 6).

Avvertenze e Precauzioni

Si rivolga al medico o al farmacista prima di usare Gaviscon Bruciore e Indigestione se:

- soffre o ha sofferto di **malattie significative ai reni o al cuore**, in quanto alcuni sali possono interferire con queste malattie (si rivolga al medico riguardo il contenuto di sali)
- ha **gravi problemi renali**
- ha disturbi elettrolitici che causano **bassi livelli di fosfato** nel sangue (ipofosfatemia)
- se sa di avere una **quantità ridotta di acido gastrico** nello stomaco, in quanto questo medicinale potrebbe essere meno efficace.

Così come per altri prodotti antiacido, l'assunzione di questo medicinale può mascherare i sintomi di altre malattie pre-esistenti più gravi.

- contiene solfiti: raramente possono causare gravi reazioni allergiche (ipersensibilità) e respiro sibilante o difficoltà respiratorie (broncospasmo).

Se i sintomi persistono dopo 7 giorni, consulti il medico.

Bambini

Non dia questo medicinale a bambini al di sotto dei 12 anni di età senza il consiglio del medico.

Vi è il rischio che aumentino i livelli di sodio nel sangue (ipernatriemia) nei bambini che hanno problemi renali o che hanno un'infezione dello stomaco o dell'intestino (gastroenterite).

Altri medicinali e Gaviscon Bruciore e Indigestione

Non prenda questo medicinale entro due ore dall'assunzione di altri medicinali per via orale perché può interferire con l'azione di alcuni altri medicinali.

Specialmente se sta assumendo antistaminici, antibiotici (tetracicline e chinoloni come norfloxacina), sali di ferro, ormoni tiroidei, antifungini come ketoconazolo, digossina e beta-bloccanti (medicinali utilizzati per patologie cardiache), neurolettici (medicinali utilizzati per i disturbi della mente), tiroxina, cloroquina (medicinale utilizzato per curare la malaria), bifosfonati (medicinali utilizzati per curare alcune malattie delle ossa), ed estramustina (medicinale utilizzato contro il cancro alla prostata).

Informi il medico o il farmacista se sta assumendo o ha recentemente assunto qualsiasi altro medicinale, inclusi quelli senza obbligo di prescrizione.

Gravidanza, allattamento e fertilità

Può prendere questo medicinale se è incinta o se sta allattando al seno o se sta pianificando una gravidanza. Come per tutti i medicinali, la durata del trattamento deve essere limitata il più possibile.

Informazioni importanti su alcuni componenti di Gaviscon Bruciore e Indigestione

Questo medicinale contiene metile paraidrossibenzoato (E218) e propile paraidrossibenzoato (E216) che possono causare reazioni allergiche (anche ritardate).

Contiene solfiti che possono causare reazioni allergiche incluso broncospasmo.

Una dose di 20 ml contiene 9,12 mg di glicole propilenico (E1520).

Una dose di 20 ml contiene anche 255,76 mg (11,12 mmol) di sodio. La dose massima giornaliera raccomandata di questo medicinale contiene 1021 mg di sodio (componente principale del sale da cucina). Questo equivale al 51% dell'assunzione massima giornaliera raccomandata con la dieta di un adulto. Chieda al suo medico o al farmacista se ha bisogno di Gaviscon Bruciore e Indigestione giornalmente per un lungo periodo, soprattutto se segue una dieta a basso contenuto di sodio.

Inoltre, una dose di 20 ml di questo medicinale contiene 260 mg (6,5 mmol) di calcio. Si rivolga al medico prima di usare questo medicinale se ha calcoli renali o alti livelli di calcio nel sangue.

3. COME PRENDERE GAVISCON BRUCIORE E INDIGESTIONE

Usi questo medicinale seguendo sempre esattamente quanto riportato in questo foglio o le istruzioni del medico o del farmacista. Se ha dubbi consulti il medico o il farmacista.

Agiti la sospensione prima dell'uso.

Adulti e bambini da 12 anni in su: quando i sintomi si presentano, 10-20 ml dopo i pasti e la sera prima di andare a letto, fino a quattro volte al giorno.

Se prende più Gaviscon Bruciore e Indigestione di quanto deve

Se prende più Gaviscon Bruciore e Indigestione di quanto deve è improbabile che questo le provochi danno. Tuttavia si può sentire gonfio. Consulti il suo medico se questo sintomo non passa.

Se dimentica di prendere Gaviscon Bruciore e Indigestione

Se dimentica una dose non è necessario raddoppiare la dose la volta successiva, continui a prenderlo come prima.

4. POSSIBILI EFFETTI INDESIDERATI

Come tutti i medicinali, questo medicinale può causare effetti indesiderati, sebbene non tutte le persone li manifestino.

Se si verificano questi effetti indesiderati smetta di prendere questo medicinale e consulti immediatamente un medico.

Molto raramente (meno di 1 paziente su 10.000) c'è la possibilità di una reazione allergica ai componenti del medicinale che possono manifestarsi con gonfiore del viso, labbra, lingua o gola, e difficoltà respiratorie (reazione anafilattica, reazione anafilattoide) o eruzione cutanea pruriginosa (orticaria). Altri sintomi possono includere dolore addominale, diarrea, nausea, vomito, prurito della pelle, prurito o eruzione cutanea e respiro affannoso (broncospasmo).

L'ingestione di grandi quantità di calcio carbonato, un componente di questo medicinale, può causare un aumento del pH del sangue (alcalosi), troppo calcio nel sangue (ipercalcemia), che può portare la sindrome da latte-alcali, un'aumentata secrezione di acido nello stomaco (effetto molto raro), e costipazione. Questi sintomi si verificano normalmente a seguito di assunzione di dosi superiori rispetto alla dose raccomandata.

Segnalazione degli effetti indesiderati

Se manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista. Può inoltre segnalare gli effetti indesiderati direttamente tramite il sistema nazionale di segnalazione all'indirizzo <https://www.aifa.gov.it/content/segnalazioni-reazioni-avverse>.

5. COME CONSERVARE GAVISCON BRUCIORE E INDIGESTIONE

Conservi questo medicinale fuori dalla vista e dalla portata dei bambini. Non usi questo medicinale dopo la data di scadenza che è riportata sull'etichetta dopo Scad. (mese/anno). La data di scadenza si riferisce all'ultimo giorno di quel mese.

Non refrigerare o congelare. Utilizzare entro 6 mesi dalla data di apertura. Verificare che il sigillo del tappo sia integro prima di utilizzare questo prodotto per la prima volta.

Non getti alcun medicinale nell'acqua di scarico e nei rifiuti domestici. Chieda al farmacista come eliminare i medicinali che non utilizza più. Questo aiuterà a proteggere l'ambiente.

6. CONTENUTO DELLA CONFEZIONE E ALTRE INFORMAZIONI

Cosa contiene Gaviscon Bruciore e Indigestione

- I principi attivi sono sodio alginato, sodio bicarbonato e calcio carbonato. 10 ml di sospensione contengono 500 mg di sodio alginato e 213 mg di sodio bicarbonato e 325 mg di calcio carbonato.
- Gli altri componenti sono carbomero, metile paraidrossibenzoato (E218), propile paraidrossibenzoato (E216), saccarina sodica, aroma menta (contiene glicole propilenico (E1520)), sodio idrossido, acqua depurata. Questo medicinale non contiene zucchero o glutine.

Descrizione dell'aspetto di Gaviscon Bruciore e Indigestione e contenuto della confezione

Gaviscon Bruciore e Indigestione contiene una sospensione biancastra con odore e aroma di menta.

Gaviscon Bruciore e Indigestione è disponibile in una confezione contenente: 1 flacone in vetro ambrato da 300 ml o 500 ml di sospensione orale. Può essere fornito con misurino dosatore (in polipropilene naturale) con tacche da 5ml, 10ml, 15ml e 20 ml.

È possibile che non tutte le confezioni siano commercializzate. È possibile che il confezionamento secondario (scatola di cartone) e il misurino dosatore non sia fornito in tutti i paesi/confezioni autorizzate.

Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio

Reckitt Benckiser Healthcare (Italia) S.p.A.

Via G. Spadolini, 7

20141 Milano

Produttore

RB NL Brands B.V., Schiphol Boulevard 207, Schiphol 1118BH, Paesi Bassi

Questo medicinale è autorizzato negli Stati Membri dello Spazio Economico Europeo con le seguenti denominazioni:

Paesi Bassi: Gaviscon Duo suspensie, muntsmaak

Questo foglio illustrativo è stato aggiornato il:

Foglio illustrativo: informazioni per l'utilizzatore

Gaviscon Bruciore e Indigestione compresse masticabili gusto menta

Sodio alginato/Sodio bicarbonato/Calcio carbonato

250 mg/106,5 mg/187,5 mg

Legga attentamente questo foglio prima di usare questo medicinale perché contiene importanti informazioni per lei.

Usi questo medicinale sempre come esattamente descritto in questo foglio o come il medico o il farmacista le ha detto di fare.

- Conservi questo foglio. Potrebbe aver bisogno di leggerlo di nuovo.
- Se desidera maggiori informazioni o consigli, si rivolga al farmacista.
- Se si manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, inclusi quelli non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista. Vedere paragrafo 4.
- **Si rivolga al medico se non nota miglioramenti o se nota un peggioramento dei sintomi dopo 7 giorni.**

Contenuto di questo foglio:

1. Cos'è Gaviscon Bruciore e Indigestione e a cosa serve
2. Cosa deve sapere prima di prendere Gaviscon Bruciore e Indigestione
3. Come prendere Gaviscon Bruciore e Indigestione
4. Possibili effetti indesiderati
5. Come conservare Gaviscon Bruciore e Indigestione
6. Contenuto della confezione e altre informazioni

1. COS'È GAVISCON BRUCIORE E INDIGESTIONE E A COSA SERVE

Gaviscon Bruciore e Indigestione è una combinazione di due antiacidi (calcio carbonato e sodio bicarbonato) e di un alginato che agisce in due modi.

5. Formando una barriera protettiva sul contenuto dello stomaco per lenire il bruciore nel suo torace fino a 4 ore.
6. Neutralizzando l'eccesso di acido nello stomaco per alleviare il dolore e il fastidio.

Questo medicinale è indicato per il trattamento dei sintomi del reflusso gastro-esofageo correlati all'acidità, quali rigurgito acido, bruciore di stomaco ed indigestione, ad esempio dopo i pasti o durante la gravidanza.

2. COSA DEVE SAPERE PRIMA DI PRENDERE GAVISCON BRUCIORE E INDIGESTIONE

Non prenda Gaviscon Bruciore e Indigestione

- se è allergico ai principi attivi o ad uno qualsiasi degli altri componenti di questo medicinale (elencati al paragrafo 6).

Avvertenze e Precauzioni

Si rivolga al medico o al farmacista prima di usare Gaviscon Bruciore e Indigestione se:

- soffre o ha sofferto di **malattie significative ai reni o al cuore**, in quanto alcuni sali possono interferire con queste malattie (si rivolga al medico riguardo il contenuto di sali)
- se il medico le ha detto che ha un'intolleranza a qualche zucchero
- ha **gravi problemi renali**
- ha disturbi elettrolitici che causano **bassi livelli di fosfato** nel sangue (ipofosfatemia).
- se sa di avere una **quantità ridotta di acido gastrico** nello stomaco, in quanto questo medicinale potrebbe essere meno efficace.

Così come per altri prodotti antiacido, l'assunzione di Gaviscon Bruciore e Indigestione sospensione orale gusto menta in bustine può mascherare i sintomi di altre malattie pre-esistenti più gravi.

- contiene solfiti: raramente possono causare gravi reazioni allergiche (ipersensibilità) e respiro sibilante o difficoltà respiratorie (broncospasmo)

Se i sintomi persistono dopo 7 giorni, consulti il medico.

Bambini

Non dia questo medicinale a bambini al di sotto dei 12 anni di età senza il consiglio del medico.

Vi è il rischio che aumentino i livelli di sodio nel sangue (ipernatriemia) nei bambini che hanno problemi renali o che hanno un'infezione dello stomaco o dell'intestino (gastroenterite).

Altri medicinali e Gaviscon Bruciore e Indigestione

Non prenda questo medicinale entro due ore dall'assunzione di altri medicinali per via orale perché può interferire con l'azione di alcuni altri medicinali.

Specialmente se lei sta assumendo antistaminici, antibiotici (tetracicline e chinoloni come norfloxacina), sali di ferro, ormoni tiroidei, antifungini come ketoconazolo, digossina e beta-bloccanti (medicinali utilizzati per patologie cardiache), neurolettici (medicinali utilizzati per i disturbi della mente), tiroxina, cloroquina (medicinale utilizzato per curare la malaria), bifosfonati (medicinali utilizzati per curare alcune malattie delle ossa), ed estramustina (medicinale utilizzato contro il cancro alla prostata).

Informi il medico o il farmacista se sta assumendo o ha recentemente assunto qualsiasi altro medicinale, inclusi quelli senza obbligo di prescrizione.

Gravidanza, allattamento e fertilità

Può prendere questo medicinale se è incinta o se sta allattando al seno o se sta pianificando una gravidanza. Come per tutti i medicinali, la durata del trattamento deve essere limitata il più possibile.

Informazioni importanti su alcuni componenti di Gaviscon Bruciore e Indigestione

Ogni compressa masticabile contiene 5,86 mg di aspartame (E951).

L'aspartame è una fonte di fenilalanina e può esserle dannosa per pazienti affetti da fenilchetonuria, una rara malattia genetica che causa l'accumulo di fenilalanina perché il corpo non riesce a smaltirla correttamente.

Le compresse contengono carmoisina (E122) che può causare una reazione allergica.

Questo medicinale contiene 223,7 mg (9,728 mmoli) di sodio per 4 compresse. La dose massima giornaliera raccomandata di questo medicinale contiene 895 mg di sodio (componente principale del sale da cucina). Questo equivale al 44,75% dell'assunzione massima giornaliera raccomandata con la dieta di un adulto. Chieda al suo medico o al farmacista se ha bisogno di Gaviscon Bruciore e Indigestione giornalmente per un lungo periodo, soprattutto se segue una dieta a basso contenuto di sodio.

Inoltre, questo medicinale contiene 300 mg (7,5 mmol) di calcio per 4 compresse. Si rivolga al medico prima di usare questo medicinale se ha calcoli renali o alti livelli di calcio nel sangue.

Se il medico le ha detto che ha un'intolleranza a qualche zucchero, contatti il medico prima di prendere questo medicinale.

3. COME PRENDERE GAVISCON BRUCIORE E INDIGESTIONE

Usi questo medicinale seguendo sempre esattamente quanto riportato in questo foglio o le istruzioni del medico o del farmacista. Se ha dubbi consulti il medico o il farmacista.

Adulti e bambini da 12 anni in su: quando i sintomi si presentano prenda da 2 a 4 compresse dopo i pasti e la sera prima di andare a letto, fino a quattro volte al giorno.

Per somministrazione orale, le compresse devono essere masticate prima di ingerirle.

Se prende più Gaviscon Bruciore e Indigestione di quanto deve

Se prende più Gaviscon Bruciore e Indigestione di quanto deve è improbabile che questo le provochi danno. Tuttavia si può sentire gonfio. Consulti il suo medico se questo sintomo non passa.

Se dimentica di prendere Gaviscon Bruciore e Indigestione

Se dimentica una dose non è necessario raddoppiare la dose la volta successiva, continui a prenderlo come prima.

4. POSSIBILI EFFETTI INDESIDERATI

Come tutti i medicinali, questo medicinale può causare effetti indesiderati, sebbene non tutte le persone li manifestino.

Se si verificano questi effetti indesiderati smetta di prendere questo medicinale e consulti immediatamente un medico.

Molto raramente (meno di 1 paziente su 10.000) c'è la possibilità di una reazione allergica ai componenti del medicinale che possono manifestarsi con gonfiore del viso, labbra, lingua o gola, e difficoltà respiratorie (reazione anafilattica, reazione anafilattoide) o eruzione cutanea pruriginosa (orticaria). Altri sintomi possono includere dolore addominale, diarrea, nausea, vomito, prurito della pelle, prurito o eruzione cutanea e respiro affannoso (broncospasmo).

L'ingestione di grandi quantità di calcio carbonato, un componente di questo medicinale, può causare un aumento del pH del sangue (alcalosi), troppo calcio nel sangue (ipercalcemia), che può portare la sindrome da latte-alcali, un'aumentata secrezione di acido nello stomaco (effetto molto raro), e costipazione. Questi sintomi si verificano normalmente a seguito di assunzione di dosi superiori rispetto alla dose raccomandata.

Segnalazione degli effetti indesiderati

Se manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista. Può inoltre segnalare gli effetti indesiderati direttamente tramite il sistema nazionale di segnalazione all'indirizzo <https://www.aifa.gov.it/content/segnalazioni-reazioni-avverse>.

5. COME CONSERVARE GAVISCON BRUCIORE E INDIGESTIONE

Conservi questo medicinale fuori dalla vista e dalla portata dei bambini. Non usi questo medicinale dopo la data di scadenza che è riportata sull'astuccio dopo Scad. (mese/anno). La data di scadenza si riferisce all'ultimo giorno di quel mese.

Non conservare a temperatura superiore a 30°C. Conservare nella confezione originale per proteggere il medicinale dall'umidità.

Non getti alcun medicinale nell'acqua di scarico e nei rifiuti domestici. Chieda al farmacista come eliminare i medicinali che non utilizza più. Questo aiuterà a proteggere l'ambiente.

6. CONTENUTO DELLA CONFEZIONE E ALTRE INFORMAZIONI

Cosa contiene Gaviscon Bruciore e Indigestione

- I principi attivi per ogni compressa sono 250 mg di sodio alginato, 106,5 mg di sodio bicarbonato e 187,5 mg di calcio carbonato.
- Gli altri componenti sono xilitolo (contiene carmellosa sodica), magnesio stearato, macrogol, mannitolo (E421), copovidone, acesulfame-K, aspartame (E951), aroma menta (contiene maltodestrina e gomma arabica) e carmoisina (E122). Il prodotto non contiene glutine.

Descrizione dell'aspetto di Gaviscon Bruciore e Indigestione e contenuto della confezione

Compresse piatte, rotonde, a doppio strato con bordi smussati e con odore e sapore di menta. Uno strato della compressa è di colore rosa leggermente screziato, l'altro strato è bianco.

Gaviscon Bruciore e Indigestione è disponibile in confezioni contenenti 16, 24, 48 e 60 compresse masticabili.

È possibile che non tutte le confezioni siano commercializzate.

Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio

Reckitt Benckiser Healthcare (Italia) S.p.A.
Via G. Spadolini, 7
20141 Milano

Produttore

RB NL Brands B.V., Schiphol Boulevard 207, Schiphol 1118BH, Paesi Bassi

Questo medicinale è autorizzato negli Stati Membri dello Spazio Economico Europeo con le seguenti denominazioni:

Paesi Bassi: Gaviscon Duo muntsmaak, kauwtabletten

Questo foglio illustrativo è stato aggiornato il:

Foglio illustrativo: Informazioni per l'utilizzatore

Gaviscon Bruciore e Indigestione sospensione orale in bustina gusto frutti rossi
sodio alginato/sodio bicarbonato/calcio carbonato
500 mg / 213 mg / 325 mg

Legga attentamente questo foglio prima di usare questo medicinale perché contiene importanti informazioni per lei.

Usi questo medicinale sempre come esattamente descritto in questo foglio o come il medico o il farmacista le hanno detto di fare.

- Conservi questo foglio. Potrebbe aver bisogno di leggerlo di nuovo.
- Se desidera maggiori informazioni o consigli, si rivolga al farmacista.
- Se si manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, inclusi quelli non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista. Vedere paragrafo 4.
- **Si rivolga al medico se non nota miglioramenti o se nota un peggioramento dei sintomi dopo 7 giorni.**

Contenuto di questo foglio:

1. **Cos'è Gaviscon Bruciore e Indigestione e a cosa serve**
2. **Cosa deve sapere prima di prendere Gaviscon Bruciore e Indigestione**
3. **Come prendere Gaviscon Bruciore e Indigestione**
4. **Possibili effetti indesiderati**
5. **Come conservare Gaviscon Bruciore e Indigestione**
6. **Contenuto della confezione e altre informazioni**

1. Cos'è Gaviscon Bruciore e Indigestione e a cosa serve

Gaviscon Bruciore e Indigestione è una combinazione di un alginato e due antiacidi (calcio carbonato e sodio bicarbonato) che agisce in due modi:

1. formando una barriera protettiva sul contenuto dello stomaco per lenire il bruciore nel suo torace fino a 4 ore.
2. neutralizzando l'eccesso di acido nello stomaco per alleviare il dolore e il fastidio.

Questo medicinale viene usato per il trattamento dei sintomi del reflusso gastro-esofageo correlati all'acidità, quali bruciore di stomaco, rigurgito acido e indigestione, ad esempio dopo i pasti in adulti e bambini a partire dai 12 anni di età o durante la gravidanza.

2. Cosa deve sapere prima di prendere Gaviscon Bruciore e Indigestione

Non prenda Gaviscon Bruciore e Indigestione:

- se è allergico ad uno qualsiasi dei componenti di questo medicinale (elencati al paragrafo 6).

Avvertenze e precauzioni

Si rivolga al medico o al farmacista prima di prendere Gaviscon Bruciore e Indigestione se:

- Soffre o ha sofferto di malattie significative ai reni o al cuore, in quanto alcuni sali possono interferire con queste malattie (si rivolga al medico riguardo il contenuto di sali) soffre di **gravi problemi ai reni**.

- Soffre di disturbi elettrolitici che causano bassi **livelli di fosfato** nel sangue (ipofosfatemia)
- È consapevole di avere quantità ridotte di acido gastrico nel suo stomaco, poiché questo medicinale potrebbe essere meno efficace.

Contiene solfiti: può raramente causare gravi reazioni allergiche (ipersensibilità), respiro sibilante o difficoltà a respirare (broncospasmo).

L'uso prolungato dovrebbe essere evitato. Così come per altri prodotti medicinali antiacido, l'assunzione di questo medicinale può mascherare i sintomi di altre patologie pre-esistenti più gravi.

Se i sintomi persistono dopo 7 giorni, si rivolga al medico.

Bambini

Si sconsiglia la somministrazione a bambini al di sotto di 12 anni.

Vi è il rischio che aumentino i livelli di sodio nel sangue (ipernatriemia) nei bambini che hanno problemi renali o che hanno un'infezione dello stomaco o dell'intestino (gastroenterite).

Altri medicinali e Gaviscon Bruciore e Indigestione

Non prenda questo medicinale entro due ore dall'assunzione di altri medicinali per via orale poiché può interferire con l'azione di alcuni altri medicinali. Ciò è particolarmente importante se si stanno assumendo antistaminici (per i sintomi allergici), antibiotici (tetracicline e chinoloni come norfloxacina per il trattamento delle infezioni batteriche), preparati a base di ferro (per disturbi associati alla carenza di ferro), ormoni tiroidei (per la carenza di ormone tiroideo), antimicotici come ketoconazolo (per il trattamento delle infezioni fungine), digossina e betabloccanti (per patologie cardiache), neurolettici (per trattare alcuni disturbi mentali), tiroxina (per la carenza di ormone tiroideo), cloroquina (per la malaria), bifosfonati (per osteoporosi) ed estramustina (per il cancro alla prostata).

Informi il medico o il farmacista se sta assumendo o ha recentemente assunto qualsiasi altro medicinale, compresi quelli senza obbligo di prescrizione.

Gravidanza, allattamento e fertilità:

Può prendere questo medicinale se è incinta, sta pianificando una gravidanza o sta allattando al seno. Come per tutti i medicinali, la durata del trattamento deve essere limitata il più possibile.

Informazioni importanti su alcuni componenti di Gaviscon Bruciore e Indigestione Sospensione orale in bustina.

Questo medicinale contiene 40 mg di metile-paraidrossibenzoato (E218) e 6 mg di propile-paraidrossibenzoato (E216) per bustina, che possono causare reazioni allergiche (anche ritardate).

Questo medicinale contiene 32 mg di glicole propilenico (E1520) in ogni bustina.

Questo medicinale contiene 128 mg (5,6 mmol) di sodio per 10 ml/1 bustina. La dose giornaliera massima raccomandata di questo prodotto contiene 1023 mg di sodio (presente nel sale da cucina). Ciò equivale al 51% dell'apporto dietetico massimo giornaliero di sodio raccomandato per un adulto. Si rivolga al farmacista o al medico se ha bisogno di assumere Gaviscon Bruciore e Indigestione su base giornaliera per un periodo di tempo prolungato, soprattutto se Le è stato consigliato di seguire una dieta a basso contenuto di sodio.

Inoltre, questo medicinale contiene 130 mg (3,25 mmol) di calcio per bustina. Si rivolga al medico prima di usare questo medicinale se ha calcoli renali o alti livelli di calcio nel sangue.

3. Come prendere Gaviscon Bruciore e Indigestione

Usi questo medicinale seguendo sempre esattamente quanto riportato in questo foglio o le istruzioni del medico o del farmacista. Se ha dubbi consulti il medico o il farmacista.

Per uso orale.

Adulti e bambini a partire dai 12 anni di età: alla comparsa dei sintomi assumere 10-20 ml (una o due bustine) dopo i pasti e prima di coricarsi, fino a quattro volte al giorno.

Bambini con meno di 12 anni: si sconsiglia la somministrazione a bambini al di sotto di 12 anni.

Se prende più Gaviscon Bruciore e Indigestione di quanto deve:

Se prende più Gaviscon Bruciore e Indigestione di quanto deve, è improbabile che questo le provochi danno. Tuttavia, si può sentire gonfio ed avvertire del fastidio a livello addominale. Consulti il suo medico se questo sintomo non passa.

Se dimentica di prendere Gaviscon Bruciore e Indigestione: Se dimentica una dose, non raddoppi la dose la volta successiva, ma continui a prenderlo come prima.

4. Possibili effetti indesiderati

Come tutti i medicinali, Gaviscon Bruciore e Indigestione può causare effetti indesiderati, sebbene non tutte le persone li manifestino.

Se si manifesta uno qualsiasi dei seguenti effetti indesiderati, interrompa l'assunzione del medicinale e consulti immediatamente il medico:

- Molto raramente (in meno di 1 paziente su 10.000) c'è la possibilità di una reazione allergica ai componenti del medicinale. I sintomi possono includere gonfiore di viso, labbra, lingua o gola e difficoltà respiratorie (reazione anafilattica, reazione anafilattoide) o eruzione cutanea pruriginosa (orticaria).
- Altri sintomi possono includere dolore addominale, diarrea, nausea, vomito, prurito o eruzione cutanea e respiro sibilante (broncospasmo).

L'ingestione di grandi quantità di calcio carbonato, un componente di questo medicinale, può causare un aumento del pH del sangue (alcalosi), troppo calcio nel sangue (ipercalcemia), un'aumentata secrezione di acido nello stomaco, e costipazione. Questi sintomi si verificano normalmente a seguito di assunzione di dosi superiori a quella raccomandata.

Segnalazione degli effetti indesiderati

Se manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista. Può inoltre segnalare gli effetti indesiderati direttamente tramite il sistema nazionale di segnalazione all'indirizzo <https://www.aifa.gov.it/content/segnalazioni-reazioni-avverse>. Segnalando gli effetti indesiderati può contribuire a fornire maggiori informazioni sulla sicurezza di questo medicinale.

5. Come conservare Gaviscon Bruciore e Indigestione

Conservi questo medicinale fuori dalla vista e dalla portata dei bambini.

Non usi questo medicinale dopo la data di scadenza che è riportata sulla scatola e sulla bustina dopo "Scad." (mese/anno). La data di scadenza si riferisce all'ultimo giorno di quel mese.

Non conservare a temperatura superiore a 30°C. Non refrigerare o congelare.

Non getti alcun medicinale nell'acqua di scarico e nei rifiuti domestici. Chieda al farmacista come eliminare i medicinali che non utilizza più. Questo aiuterà a proteggere l'ambiente.

6. Contenuto della confezione e altre informazioni

Cosa contiene Gaviscon Bruciore e Indigestione:

I principi attivi in ogni bustina da 10 ml sono 500 mg di sodio alginato, 213 mg di sodio bicarbonato e 325 mg di calcio carbonato.

Gli altri componenti sono: carbomeri, metile paraidrossibenzoato (E218), propile paraidrossibenzoato (E216), saccarina sodica, aroma lampone, aroma mirtillo rosso, aroma di frutta, sodio idrossido e acqua depurata. Gli aromi contengono glicole propilenico (E1520).

Descrizione dell'aspetto di Gaviscon bruciore e Indigestione e contenuto della confezione:

Gaviscon Bruciore e Indigestione contiene una sospensione di colore variabile, da biancastro a crema, con odore e sapore di frutti rossi.

Gaviscon Bruciore e Indigestione è disponibile in confezioni contenenti 4, 12, 24 e 48 bustine. È possibile che non tutte le confezioni siano commercializzate.

Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio

Reckitt Benckiser Healthcare (Italia) S.p.A. - Via G. Spadolini, 7 - 20141 Milano

Produttore

RB NL Brands B.V., Schiphol Boulevard 207, Schiphol 1118BH, Paesi Bassi

Questo medicinale è autorizzato negli Stati Membri della SEE con le seguenti denominazioni:

Paesi Bassi: Gaviscon Duo bosvruchtensmaak 500 mg/213 mg/325 mg, suspensie voor oraal gebruik in sachets

Questo foglietto illustrativo è stato aggiornato il

Foglio illustrativo: Informazioni per l'utilizzatore

Gaviscon Bruciore e Indigestione compresse masticabili gusto frutti rossi

sodio alginato / sodio bicarbonato / calcio carbonato

250 mg / 106,5 mg / 187,5 mg

Legga attentamente questo foglio prima di usare questo medicinale perché contiene importanti informazioni per lei.

Usi questo medicinale sempre come esattamente descritto in questo foglio o come il medico o il farmacista le hanno detto di fare.

- Conservi questo foglio. Potrebbe aver bisogno di leggerlo di nuovo.
- Se desidera maggiori informazioni o consigli, si rivolga al farmacista.
- Se si manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, inclusi quelli non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista. Vedere paragrafo 4.
- **Si rivolga al medico se non nota miglioramenti o se nota un peggioramento dei sintomi dopo 7 giorni.**

Contenuto di questo foglio

1. Cos'è Gaviscon Bruciore e Indigestione e a cosa serve
2. Cosa deve sapere prima di prendere Gaviscon Bruciore e Indigestione
3. Come prendere Gaviscon Bruciore e Indigestione
4. Possibili effetti indesiderati
5. Come conservare Gaviscon Bruciore e Indigestione
6. Contenuto della confezione e altre informazioni

1. Cos'è Gaviscon Bruciore e Indigestione e a cosa serve

Si rivolga al medico se non si sente meglio o se si sente peggio dopo 7 giorni.

Gaviscon Bruciore e Indigestione è una combinazione di un alginato e due antiacidi (calcio carbonato e sodio bicarbonato) che agisce in due modi:

3. formando una barriera protettiva sul contenuto dello stomaco per lenire il bruciore nel suo torace fino a 4 ore.
4. neutralizzando l'eccesso di acido nello stomaco per alleviare il dolore e il fastidio.

Questo medicinale viene usato per il trattamento dei sintomi del reflusso gastro-esofageo correlati all'acidità, quali bruciore di stomaco, rigurgito acido e indigestione, ad esempio dopo i pasti o durante la gravidanza.

2. Cosa deve sapere prima di prendere Gaviscon Bruciore e Indigestione

Non prenda Gaviscon Bruciore e Indigestione

- se è allergico ad uno qualsiasi dei componenti di questo medicinale (elencati al paragrafo 6).

Avvertenze e precauzioni

Si rivolga al medico o al farmacista prima di usare Gaviscon Bruciore e Indigestione se:

- soffre o ha sofferto di **malattie significative ai reni o al cuore**, in quanto alcuni sali possono interferire con queste malattie (si rivolga al medico riguardo il contenuto di sali).
- il medico l'ha informata circa una sua intolleranza verso alcuni zuccheri.
- soffre di **gravi problemi ai reni**.

- soffre di disturbi elettrolitici che causano bassi **livelli di fosfato** nel sangue (ipofosfatemia).
- sa di avere quantità ridotte di acido gastrico nel suo stomaco, poiché questo medicinale potrebbe essere meno efficace.

L'uso prolungato dovrebbe essere evitato.

Così come per altri antiacidi, l'assunzione di questo medicinale può mascherare i sintomi di altre patologie pre-esistenti più gravi.

- Contiene solfiti: raramente possono causare gravi reazioni allergiche (ipersensibilità), respiro sibilante o difficoltà respiratorie (broncospasmo).

Se i sintomi persistono dopo 7 giorni, si rivolga al medico.

Bambini

Si sconsiglia la somministrazione a bambini al di sotto di 12 anni.

Vi è il rischio che aumentino i livelli di sodio nel sangue (ipernatriemia) nei bambini che hanno problemi renali o che hanno un'infezione dello stomaco o dell'intestino (gastroenterite).

Altri medicinali e Gaviscon Bruciore e Indigestione:

Non prenda questo medicinale entro due ore dall'assunzione di altri medicinali per via orale poiché può interferire con l'azione di alcuni altri medicinali.

Specialmente se lei sta assumendo antistaminici (per i sintomi allergici), antibiotici (tetracicline e chinoloni come norfloxacina (per il trattamento delle infezioni batteriche), preparati a base di ferro (per disturbi associati alla carenza di ferro), ormoni tiroidei (per la carenza di ormone tiroideo), antimicotici come ketoconazolo (per il trattamento delle infezioni fungine), digossina e betabloccanti (per patologie cardiache), neurolettici (per trattare alcuni disturbi mentali), tiroxina (per la carenza di ormone tiroideo), cloroquina (per la malaria), bifosfonati (per osteoporosi) e estramustina (per il cancro alla prostata).

Informi il medico o il farmacista se sta assumendo o ha recentemente assunto qualsiasi altro medicinale, inclusi quelli senza obbligo di prescrizione.

Gravidanza, allattamento e fertilità:

Può prendere questo medicinale se è incinta, sta pianificando una gravidanza o sta allattando al seno. Come per tutti i medicinali, la durata del trattamento deve essere limitata il più possibile.

Importanti informazioni circa alcuni componenti di questo medicinale:

Questo medicinale contiene 5,86 mg di aspartame (E951) in ogni compressa masticabile. L'aspartame è una fonte di fenilalanina. Può essere dannoso se si soffre di fenilchetonuria (PKU), una rara malattia genetica in cui la fenilalanina si accumula in quanto l'organismo non riesce a rimuoverla correttamente.

Queste compresse masticabili contengono carmoisina (E122) che può causare una reazione allergica.

Questo medicinale contiene 223,7 mg (9,728 mmol) di sodio per quattro compresse masticabili. La dose giornaliera massima raccomandata di questo prodotto contiene 895 mg di sodio (presente nel sale da cucina). Questo equivale al 44,75% dell'assunzione massima giornaliera raccomandata con la dieta di un adulto. Si rivolga al farmacista o al medico se ha bisogno di assumere Gaviscon Bruciore e Indigestione su base giornaliera per un periodo di tempo prolungato, soprattutto se Le è stato consigliato di seguire una dieta a basso contenuto di sodio.

Inoltre, questo medicinale contiene 300 mg (7,5 mmol) di calcio per 4 compresse. Si rivolga al medico prima di usare questo medicinale se ha calcoli renali o alti livelli di calcio nel sangue.

Se il medico le ha diagnosticato un'intolleranza ad alcuni zuccheri, lo contatti prima di prendere questo medicinale.

3. Come prendere Gaviscon Bruciore e Indigestione

Usi questo medicinale seguendo sempre esattamente quanto riportato in questo foglio o le istruzioni del medico o del farmacista. Se ha dubbi consulti il medico o il farmacista.

Per uso orale, le compresse devono essere masticate prima di ingerirle.

Adulti e bambini a partire dai 12 anni di età:

Alla comparsa dei sintomi, prendere da due a quattro compresse masticabili dopo i pasti e prima di coricarsi, fino a quattro volte al giorno.

Bambini al di sotto di 12 anni di età:

Si sconsiglia la somministrazione a bambini al di sotto di 12 anni.

Se prende più Gaviscon Bruciore e Indigestione di quanto deve:

Se prende più Gaviscon Bruciore e Indigestione di quanto deve è improbabile che questo le provochi danno. Tuttavia, si può sentire gonfio ed avvertire del fastidio a livello addominale. Consulti il suo medico se questo sintomo non passa.

Se dimentica di prendere Gaviscon Bruciore e Indigestione:

Se dimentica una dose, non raddoppi la dose la volta successiva, ma continui a prenderlo come prima.

4. Possibili effetti indesiderati

Come tutti i medicinali, questo medicinale può causare effetti indesiderati sebbene non tutte le persone li manifestino.

Se si manifesta uno qualsiasi dei seguenti effetti indesiderati, interrompa l'assunzione del medicinale e contatti immediatamente il medico: possibilità molto rara (può interessare fino a 1 persona su 10.000) che si verifichi una reazione allergica agli ingredienti. I sintomi possono includere dolore addominale, diarrea, nausea, vomito, eruzione cutanea, prurito, vertigine, gonfiore di viso, labbra, lingua o gola e difficoltà respiratorie.

L'ingestione di grandi quantità di calcio carbonato, un componente di questo medicinale, può causare un aumento del pH del sangue (alcalosi), troppo calcio nel sangue (ipercalcemia), un'aumentata secrezione di acido nello stomaco e costipazione. Questi sintomi si verificano normalmente a seguito di assunzione di dosi superiori a quelle raccomandate.

Segnalazione degli effetti indesiderati

Se manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista. Può inoltre segnalare gli effetti indesiderati direttamente tramite il sistema nazionale di segnalazione all'indirizzo <https://www.aifa.gov.it/content/segnalazioni-reazioni-avverse>. Segnalando gli effetti indesiderati può contribuire a fornire maggiori informazioni sulla sicurezza di questo medicinale.

5. Come conservare Gaviscon Bruciore e Indigestione

Conservi questo medicinale fuori dalla vista e dalla portata dei bambini.

Non usi questo medicinale dopo la data di scadenza che è riportata sulla confezione o sul blister dopo "Scad.". La data di scadenza si riferisce all'ultimo giorno di quel mese.

Non conservare a temperatura superiore a 30°C. Conservare il medicinale nella confezione originale per proteggerlo dall'umidità.

Non getti alcun medicinale nell'acqua di scarico e nei rifiuti domestici. Chiedi al farmacista come eliminare i medicinali che non utilizzi più. Questo aiuterà a proteggere l'ambiente.

6. Contenuto della confezione e altre informazioni

Cosa contiene Gaviscon Bruciore e Indigestione

I principi attivi in ogni compressa masticabile sono 250 mg di sodio alginato, 106,5 mg di sodio bicarbonato e 187,5 mg di calcio carbonato.

Gli altri ingredienti sono xilitolo, carmellosa sodica, magnesio stearato, macrogoli, mannitolo (E421), copovidone, acesulfame potassico, aspartame (E951), aroma di mirtillo rosso, aroma di lampone, aroma di frutta e carmoisina (E122).

Gli aromi contengono glicole propilenico (E1520) e saccarosio.

Descrizione dell'aspetto di Gaviscon Bruciore e Indigestione e contenuto della confezione

Compressa masticabile da 15 mm, piatta, circolare, a doppio strato, con bordi smussati e con odore e sapore di frutti rossi. Uno strato della compressa masticabile è di colore rosa con lievi venature e con marcature superficiali GDB, mentre l'altro strato è bianco con marcature a forma di spada e cerchio.

Questo medicinale è disponibile in confezioni da 16, 24, 48 e 60 compresse masticabili.

È possibile che non tutte le confezioni siano commercializzate.

Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio

Reckitt Benckiser Healthcare (Italia) S.p.A., Via G. Spadolini 7, 20141 Milano

Produttore

RB NL Brands B.V., Schiphol Boulevard 207, Schiphol 1118BH, Paesi Bassi

Questo medicinale è autorizzato negli Stati Membri della SEE con le seguenti denominazioni:

Paesi Bassi:	Gaviscon Duo bosvruchtensmaak 250 mg/106,5 mg /187,5 mg, kauwtabletten
Italia:	Gaviscon Bruciore e Indigestione
Grecia:	GAVICON DOUBLE ACTION Mixed Berries μασώμενο δισκίο
Cipro:	GAVICON DOUBLE ACTION Mixed Berries μασώμενο δισκίο 250mg/106.5mg/187.5mg

Questo foglio illustrativo è stato aggiornato il