

Foglio illustrativo: informazioni per il paziente

EFFERALGAN INFLUENZA E RAFFREDDORE 500 mg + 4 mg compresse rivestite con film

Paracetamolo 500 mg/Clorfenamina 4 mg

Legga attentamente questo foglio prima di prendere questo medicinale perché contiene importanti informazioni per lei.

Prenda questo medicinale sempre come esattamente descritto in questo foglio o come il medico, il farmacista o l'infermiere le ha detto di fare.

- Conservi questo foglio. Potrebbe aver bisogno di leggerlo di nuovo.
- Se desidera maggiori informazioni o consigli, si rivolga al farmacista.
- Se manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, inclusi quelli non elencati in questo foglio, si rivolga al medico, al farmacista o all'infermiere. Vedere paragrafo 4.
- Si rivolga al medico se non nota miglioramenti o se nota un peggioramento dei sintomi dopo 5 giorni.

Contenuto di questo foglio

1. Cos'è EFFERALGAN INFLUENZA E RAFFREDDORE e a cosa serve
2. Cosa deve sapere prima di prendere EFFERALGAN INFLUENZA E RAFFREDDORE
3. Come prendere EFFERALGAN INFLUENZA E RAFFREDDORE
4. Possibili effetti indesiderati
5. Come conservare EFFERALGAN INFLUENZA E RAFFREDDORE
6. Contenuto della confezione e altre informazioni

1. Cos'è EFFERALGAN INFLUENZA E RAFFREDDORE e a cosa serve

Categoria farmacoterapeutica: ANTIPIRETICI ANALGESICI ANTISTAMINICI INIBITORI DEI RECETTORI H1, codice ATC: R05X

Questo medicinale contiene 2 principi attivi:

- paracetamolo, che allevia il dolore e riduce la febbre,
- clorfenamina maleato, che riduce la secrezione nasale, la lacrimazione degli occhi e gli starnuti.

Questo medicinale è indicato, in corso di raffreddore, rinite, rinofaringite e condizioni simil-influenzali negli adulti e negli adolescenti di età superiore a 15 anni, per il trattamento di:

- secrezione nasale chiara e lacrimazione degli occhi,
- starnuti,
- cefalee e/o febbre.

Per i bambini di età inferiore a 15 anni, sono disponibili altri medicinali: chiedi consiglio al medico o al farmacista.

Si rivolga al medico se non si sente meglio o se si sente peggio dopo 5 giorni.

2. Cosa deve sapere prima di prendere EFFERALGAN INFLUENZA E RAFFREDDORE

Non prenda EFFERALGAN INFLUENZA E RAFFREDDORE:

- se è allergico ai principi attivi o ad uno qualsiasi degli altri componenti di questo medicinale (elencati al paragrafo 6),
- se ha meno di 15 anni,
- se ha una malattia epatica grave,
- se presenta un rischio di glaucoma (aumento della pressione all'interno dell'occhio),
- se ha difficoltà ad urinare per problemi prostatici o di altra origine.

Avvertenze e precauzioni

Si rivolga al medico, al farmacista o all'infermiere prima di prendere EFFERALGAN INFLUENZA E RAFFREDDORE.

In caso di sovradosaggio o se per errore ha preso una dose eccessiva, consulti immediatamente il medico.

In caso di secrezione nasale purulenta o di febbre o dolore che persistono per più di 3 giorni o se i sintomi non migliorano dopo 5 giorni di trattamento, consulti il medico.

La posologia, la durata del trattamento di 5 giorni e le controindicazioni devono essere osservate rigorosamente.

Relative alla presenza di paracetamolo:

Prima di prendere questo medicinale, **deve informare il medico o il farmacista:**

- se è adulto e pesa meno di 50 kg,
- se soffre di malattie renali o epatiche,
- se è anziano,
- se consuma regolarmente alcol o ha smesso di bere alcolici di recente,
- in caso di malnutrizione cronica, digiuno, recente perdita di peso, anoressia o cachessia (basse riserve o carenza di glutazione epatico),
- in caso di disidratazione,
- in caso di carenza di Glucosio-6-Fosfato Deidrogenasi (G6PD) (può portare ad anemia emolitica),
- in caso di sindrome di Gilbert (ittero familiare non emolitico).

In caso di epatite virale acuta, interrompa il trattamento e consulti il medico.

Durante il trattamento con EFFERALGAN INFLUENZA E RAFFREDDORE, informi immediatamente il medico se:

Se soffre di malattie gravi, tra cui compromissione renale grave o sepsi (quando i batteri e le loro tossine circolano nel sangue causando danni agli organi) o di malnutrizione, alcolismo cronico o se sta assumendo anche flucloxacillina (un antibiotico). Nei pazienti in queste situazioni è stata segnalata una grave condizione chiamata acidosi metabolica (un'anomalia del sangue e dei fluidi) quando il paracetamolo è usato a dosi regolari per un periodo prolungato o quando il paracetamolo è assunto in associazione a flucloxacillina. I sintomi dell'acidosi metabolica possono includere: gravi difficoltà respiratorie con respirazione rapida profonda, sonnolenza, nausea e vomito.

Relative alla presenza di clorfenamina maleato:

Deve interrompere il trattamento e contattare immediatamente il medico o il farmacista nel caso in cui si presenti un'associazione di uno (o più) dei seguenti effetti collaterali:

- diarrea, vomito, tachicardia, elevata temperatura corporea (>38°C) sudorazione, tremori, rigidità muscolare, confusione, agitazione.

Tali reazioni avverse possono essere osservate, specialmente se sta già assumendo farmaci antidepressivi e/ o un prodotto contenente destrometorfano.

Usare con cautela nei soggetti (specialmente anziani) con problemi prostatici, con grave compromissione epatica e/o renale, predisposizione alla stipsi cronica, all'ipotensione ortostatica, alle vertigini o alla sonnolenza.

Bambini e adolescenti

Questo medicinale è indicato per il trattamento di adulti e di bambini di età superiore ai 15 anni.

Nei bambini e negli adolescenti trattati con paracetamolo, la combinazione con un altro medicinale antipiretico non è giustificata, tranne in caso di inefficacia. In caso di febbre persistente, è necessario consultare un medico.

Altri medicinali e EFFERALGAN INFLUENZA E RAFFREDDORE

Informi il medico o il farmacista se sta assumendo, ha recentemente assunto o potrebbe assumere qualsiasi altro medicinale.

Questo medicinale contiene paracetamolo e clorfenamina maleato. Anche altri medicinali li contengono.

Controlli che non stia assumendo altri medicinali contenenti paracetamolo e/o clorfenamina maleato, compresi quelli ottenuti senza prescrizione medica.

Non associ questi medicinali per non superare la dose giornaliera raccomandata. Se deve assumere altri medicinali contenenti queste sostanze, prima chieda consiglio al medico o al farmacista.

(Vedere paragrafo 3 " Come prendere EFFERALGAN INFLUENZA E RAFFREDDORE ".)

Relative alla presenza di paracetamolo:

Consulti il medico o il farmacista:

- se sta assumendo medicinali potenzialmente tossici per il fegato. La tossicità del paracetamolo può essere aumentata.

- se a lei o al suo bambino è stato prescritto un dosaggio dell'acido urico o dello zucchero nel sangue, poiché questo medicinale può alterare i risultati di questi esami.

- se sta assumendo medicinali che rallentano la coagulazione (anticoagulanti orali). A dosi elevate, EFFERALGAN INFLUENZA E RAFFREDDORE può potenziare gli effetti dei farmaci anticoagulanti. Se necessario, il medico modificherà la dose dell'anticoagulante.

- se sta assumendo flucloxacillina (antibiotico), a causa del grave rischio di anomalia del sangue e dei fluidi (detta acidosi metabolica) che devono essere trattate con urgenza (vedere paragrafo 2)

Relative alla presenza di clorfenamina maleato:

Evitare l'assunzione di sodio oxibato, di bevande alcoliche, di medicinali contenenti alcol durante il periodo di trattamento.

Contatti il medico se sta assumendo altri farmaci serotoninergici, farmaci a base di atropina (antispastici), altri farmaci sedativi, anticolinesterasici (farmaci utilizzati nel morbo di Alzheimer o nella miopatia) o oppioidi (analgesici, antitussivi e trattamenti sostitutivi).

Informi il suo medico se sta assumendo farmaci antidepressivi e/o un prodotto contenente destrometorfano.

EFFERALGAN INFLUENZA E RAFFREDDORE con cibi, bevande e alcol

Questo medicinale può aumentare la sonnolenza causata dall'alcol:

- è preferibile iniziare il trattamento la sera,
- e astenersi dall'assunzione di bevande alcoliche o di medicinali contenenti alcol durante il periodo di trattamento.

Gravidanza, allattamento e fertilità

Se è in corso una gravidanza, se sospetta o sta pianificando una gravidanza o se sta allattando con latte materno chieda consiglio al medico o al farmacista prima di prendere questo medicinale.

Gravidanza

Se necessario, EFFERALGAN INFLUENZA E RAFFREDDORE può essere usato in gravidanza. E' opportuno usare la dose più bassa possibile che riduce i suoi sintomi e assumerla per il più breve tempo possibile. Contatti il medico se i sintomi non diminuiscono.

Tuttavia, nelle fasi finali della gravidanza, un'assunzione eccessiva di questo medicinale può causare effetti neurologici nei neonati. Pertanto, prima di prendere questo medicinale, chiedi sempre consiglio al medico e non superi mai la dose raccomandata.

Allattamento

Questo medicinale è molto probabilmente escreto nel latte materno. Date le sue proprietà sedative che potrebbero avere un effetto sul neonato (letargia, tono ridotto) o, al contrario, per le sue proprietà stimolanti (insonnia), questo medicinale è sconsigliato durante l'allattamento.

Fertilità

È possibile che il paracetamolo possa alterare la fertilità femminile, reversibile con la sospensione del trattamento.

Guida di veicoli e utilizzo di macchinari

Prestare molta attenzione durante la guida di veicoli e l'utilizzo di macchinari, poiché questo medicinale può indurre un rischio di sonnolenza, in particolare all'inizio del trattamento. Se ha ulteriori domande, chiedi consiglio al medico o al farmacista.

Questo fenomeno è potenziato dall'assunzione di bevande alcoliche, di medicinali contenenti alcol o di sedativi. È preferibile iniziare il trattamento la sera.

EFFERALGAN INFLUENZA E RAFFREDDORE contiene sodio e carmoisina (azorubina) (E122).

Questo medicinale contiene meno di 1 mmol (23 mg) di sodio per compressa, cioè è essenzialmente «senza sodio».

Questo medicinale contiene carmoisina (azorubina come agente di rivestimento) (E122) che può causare reazioni allergiche.

3. Come prendere EFFERALGAN INFLUENZA E RAFFREDDORE

Prenda questo medicinale seguendo sempre esattamente le istruzioni del medico, del farmacista o dell'infermiere. Se ha dubbi consulti il medico, il farmacista o l'infermiere.

Questa presentazione è riservata agli adulti e agli adolescenti di età superiore a 15 anni.

Utilizzare la dose minima efficace per la durata più breve possibile.

Peso (età)	Dose per somministrazione	Intervallo di somministrazione	Dose giornaliera massima (comprese)
Adulti e adolescenti >50 kg (>15 anni)	1 compressa (500 mg di paracetamolo 4 mg di clorfenamina)	Minimo 4 ore	4 compresse (2.000 mg di paracetamolo 16 mg di clorfenamina)

La dose giornaliera massima di clorfenamina maleato non deve superare 16 mg al giorno, ovvero 4 compresse al giorno.

La dose massima giornaliera di paracetamolo (tenendo conto di tutti gli altri medicinali contenenti paracetamolo nella loro formula) non deve superare i 4 grammi al giorno.

Avvertenze: Per prevenire il rischio di sovradosaggio, verifichi che non vi sia paracetamolo e/o clorfenamina nella composizione di altri medicinali, compresi quelli ottenuti senza prescrizione medica. Rispetti le dosi massime consigliate o la dose prescritta dal medico: una dose superiore non allevia il dolore ma può avere gravi conseguenze sul suo fegato.

Adulti con peso inferiore a 50 kg, malnutrizione cronica, disidratazione, popolazione anziana:
chieda consiglio al medico o al farmacista.

Compromissione epatica, alcolismo cronico e sindrome di Gilbert: non superare mai i 2000 mg (2 g) di paracetamolo al giorno.

Compromissione renale: La posologia deve essere adattata in base al grado di insufficienza renale. Chieda consiglio al medico prima di assumere questo farmaco.

Se le sembra che l'effetto di questo medicinale sia troppo forte o troppo debole, non superi le dosi; chieda consiglio al medico o al farmacista.

Modo di somministrazione

Uso orale.

Le compresse devono essere deglutite intere con una bevanda (p.e. acqua, latte, succo di frutta). È preferibile iniziare il trattamento la sera considerato l'effetto sedativo di questo medicinale.

Durata del trattamento

Si sconsiglia l'uso prolungato o frequente senza controllo medico.

Se la febbre o il dolore persistono per più di 3 giorni o se i sintomi non migliorano dopo 5 giorni di trattamento, la gestione del trattamento deve essere rivalutata.

Se prende più EFFERALGAN INFLUENZA E RAFFREDDORE di quanto deve

Sospenda il trattamento e consulti **immediatamente** il medico o si rivolga al più presto ad un Pronto Soccorso.

Un sovradosaggio può essere fatale.

Il sovradosaggio di paracetamolo può causare danni al fegato, danni cerebrali, coma e persino la morte, in popolazioni particolarmente vulnerabili come i bambini piccoli, gli anziani e in determinate situazioni (malattie epatiche o renali, alcolismo cronico, malnutrizione cronica, digiuno, recente perdita di peso, sindrome di Gilbert e in pazienti trattati in concomitanza con alcuni farmaci). Sono stati segnalati anche rari casi di danno al pancreas (che causano forti dolori alla pancia e alla schiena), aumento dei livelli di amilasi nel sangue, insufficienza renale e contemporanea riduzione nel sangue di globuli rossi, globuli bianchi e piastrine.

Nelle prime 24 ore, i principali sintomi di intossicazione sono: nausea, vomito, anoressia, pallore, malessere, sudorazione, perdita di appetito, dolore addominale.

Il sovradosaggio può anche portare a: disturbi della coagulazione (formazione di coaguli e sanguinamento).

Il sovradosaggio di clorfenamina maleato può causare convulsioni (soprattutto nei bambini), perdita di coscienza e coma.

Se dimentica di prendere EFFERALGAN INFLUENZA E RAFFREDDORE

Non prenda una dose doppia per compensare la dimenticanza della compressa.

Se interrompe il trattamento con EFFERALGAN INFLUENZA E RAFFREDDORE

Non pertinente.

Se ha qualsiasi dubbio sull'uso di questo medicinale, si rivolga al medico, al farmacista o all'infermiere.

4. Possibili effetti indesiderati

Come tutti i medicinali, questo medicinale può causare effetti indesiderati sebbene non tutte le persone li manifestino.

RELATIVI AL PARACETAMOLO

Effetti indesiderati rari: possono interessare fino a 1 persona su 1.000

- arrossamento cutaneo, eruzioni cutanee, orticaria. Il trattamento deve essere interrotto immediatamente, il medico deve essere informato e non deve mai più assumere medicinali contenenti paracetamolo.
- macchie di sangue sulla pelle (porpora). Il trattamento deve essere interrotto immediatamente, consultare il medico prima di assumere qualsiasi medicinale contenente paracetamolo.
- Diarrea, dolore addominale

Effetti indesiderati molto rari: possono interessare fino a 1 persona su 10.000

- gravi reazioni cutanee. Il trattamento deve essere interrotto immediatamente, il medico deve essere informato e non deve mai più assumere medicinali contenenti paracetamolo.
- modifiche biologiche che richiedono un controllo del sangue: disturbi della funzionalità epatica, livelli anormalmente bassi di alcuni globuli bianchi o di alcune cellule del sangue come le piastrine, che possono provocare sanguinamento nasale o gengive sanguinanti. In questo caso, consultare un medico.

Frequenza Non nota: la frequenza non può essere definita sulla base dei dati disponibili

- eruzione cutanea o arrossamento della pelle o reazione allergica che può includere un improvviso gonfiore del viso e del collo che può portare a difficoltà respiratorie (angioedema) o malessere improvviso con abbassamento della pressione sanguigna (shock anafilattico).
Il trattamento deve essere interrotto immediatamente, il medico deve essere informato e lei non deve assumere altri medicinali contenenti paracetamolo.
- prove di funzionalità epatica anormali,
- eruzione cutanea con chiazze rotonde rosse con prurito e sensazione di bruciore, che lasciano chiazze colorate che possono eventualmente comparire nelle stesse sedi se il farmaco viene assunto di nuovo (eritema pigmentato fisso), difficoltà respiratorie (broncospasmo), soprattutto se in precedenza si sono verificate difficoltà respiratorie con altri medicinali come farmaci antinfiammatori non steroidei o l'acido acetilsalicilico. In tal caso, consulti il medico.
- grave condizione che può rendere il sangue più acido (chiamata acidosi metabolica), in pazienti affetti da una malattia grave che usano paracetamolo (vedere paragrafo 2)

RELATIVI ALLA CLORFENAMINA MALEATO

Frequenza Non nota: la frequenza non può essere definita sulla base dei dati disponibili

- livelli anormalmente bassi di alcuni globuli bianchi o rossi o di alcuni componenti del sangue come le piastrine.

- gonfiore, reazioni allergiche con improvviso gonfiore del viso e del collo o improvviso malessere con calo della pressione sanguigna. Il trattamento deve essere interrotto immediatamente, il medico deve essere informato e non deve mai più assumere medicinali contenenti clorfenamina maleato.
- arrossamento della pelle, eruzioni cutanee, orticaria. Il trattamento deve essere interrotto immediatamente, il medico deve essere informato e non deve mai più assumere medicinali contenenti clorfenamina maleato.
- macchie di sangue sulla pelle. Il trattamento deve essere interrotto immediatamente, consultare il medico prima di assumere qualsiasi medicinale contenente clorfenamina maleato.

Possono manifestarsi altri effetti indesiderati:

- sonnolenza, alterato stato di vigilanza, più marcati all'inizio del trattamento,
- riduzione della pressione arteriosa stando in piedi, che può essere accompagnata da vertigini,
- bocca secca, disturbi visivi, ritenzione urinaria, stipsi, palpitazioni,
- disturbi della memoria o della concentrazione (più comune nei pazienti anziani), confusione, disturbi dell'equilibrio, vertigini, allucinazioni,
- difficoltà di coordinamento dei movimenti, tremori.
- effetti di eccitazione: agitazione, nervosismo e insonnia.

Segnalazione degli effetti indesiderati

Se manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio, si rivolga al medico, al farmacista o all'infermiere. Può inoltre segnalare gli effetti indesiderati direttamente tramite il sistema nazionale di segnalazione all'indirizzo <https://www.aifa.gov.it/content/segnalazioni-reazioni-avverse>

Segnalando gli effetti indesiderati può contribuire a fornire maggiori informazioni sulla sicurezza di questo medicinale.

5. Come conservare EFFERALGAN INFLUENZA E RAFFREDDORE

Conservi questo medicinale fuori dalla vista e dalla portata dei bambini.

Non usi questo medicinale dopo la data di scadenza che è riportata sulla confezione. La data di scadenza si riferisce all'ultimo giorno di quel mese.

Questo medicinale non richiede alcuna condizione particolare di conservazione.

Non getti alcun medicinale nell'acqua di scarico e nei rifiuti domestici. Chieda al farmacista come eliminare i medicinali che non utilizza più. Questo aiuterà a proteggere l'ambiente.

6. Contenuto della confezione e altre informazioni

Cosa contiene EFFERALGAN INFLUENZA E RAFFREDDORE

- I principi attivi sono:
Paracetamolo.....500 mg
Clorfenamina maleato.....4 mg

per una compressa rivestita con film

- Gli altri componenti sono:
Croscarmellosa sodica*, ipromellosa, cellulosa microcristallina, povidone K90, glicerol dibeenato, magnesio stearato, agente di rivestimento**, acqua depurata.

**Agente di rivestimento:

Ipromellosa (E464), carmoisina (azorubina) (E122)*, carminio indaco (E132), Polidestrosio (E1200), Calcio carbonato, Talco, Trigliceridi, a catena media

*Vedere paragrafo 2

Descrizione dell'aspetto di EFFERALGAN INFLUENZA E RAFFREDDORE e contenuto della confezione

Questo medicinale si presenta in forma di compresse rivestite con film di forma oblunga e colore viola.

Confezione da 4 o 8 o 12 o 16 o 20 o 24 o 28 o 32 compresse.

È possibile che non tutte le confezioni siano commercializzate.

Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio

UPSA SAS, 3, rue Joseph Monier, Rueil Malmaison, France
rappresentata in Italia da

UPSA ITALY S.R.L. Viale Luca Gaurico 91/93 – Roma

Produttore

UPSA SAS

304, AVENUE DU DOCTEUR JEAN BRU - 47000 AGEN - FRANCIA

979, avenue des pyrenees - 47520 Le Passage- Francia

Questo medicinale è autorizzato negli Stati membri dello Spazio economico europeo con le seguenti denominazioni:

Bulgaria: Фервекс настинка и грип 500 mg/ 4 mg филмирани таблетки

Grecia: Depon Cold & Flu, επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο, (500 + 4) mg/TAB

Francia: FERVEXRHUME, comprimé pelliculé

Italia: EFFERALGAN INFLUENZA E RAFFREDDORE

Polonia: Fervex ExtraTabs, tabletki powlekane; Paracetamol 500 mg + maleinian chlorfenaminy 4 mg

Romania: Fervex raceala si gripa 500 mg / 4 mg comprimate filmate

Questo foglio illustrativo è stato aggiornato il

Altre fonti d'informazioni

Informazioni più dettagliate su questo medicinale sono disponibili sul sito web dell'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) all'indirizzo <http://www.aifa.gov.it/>

Note di educazione sanitaria:

COSA FARE IN CASO DI CONGESTIONE NASALE O RINORREA:

Questo medicinale è utilizzato per il trattamento della sensazione di naso chiuso, della cefalea e/o della febbre in corso di raffreddore negli adulti e negli adolescenti di età superiore a 15 anni.

Il raffreddore è un'infezione acuta benigna molto comune che interessa la mucosa nasale (parete interna del naso). Questa mucosa secerne un liquido che ha il compito di umidificare continuamente l'aria inalata e di combattere gli agenti infettivi. Quando la mucosa è irritata, si gonfia ed aumenta la normale secrezione di liquido con conseguente "naso che cola".

Per limitare l'insorgenza dei sintomi, osservare, per quanto possibile, le seguenti regole igieniche:

- lavarsi le mani regolarmente, soprattutto prima dei pasti o durante la loro preparazione;
- coprirsi la bocca quando si tossisce o starnutisce;
- soffiarsi il naso regolarmente con prodotti di carta monouso (per evitare di reinfettarsi), gettarli nel contenitore dei rifiuti subito dopo il loro utilizzo e lavarsi le mani;
- se si utilizza una soluzione nasale, evitare di utilizzare lo stesso beccuccio da parte di tutti i membri della famiglia;
- evitare di rendere visita ad una donna che ha partorito recentemente e al suo bambino, agli anziani o a una persona che sta assumendo immunosoppressori (corticosteroidi, medicinali per il trattamento di malattie del sangue, del cancro, ecc.). **In tali casi, si raccomanda l'uso di una mascherina.**

Per il suo benessere:

- beva a sufficienza;
- **umidifichi la mucosa nasale con idonee soluzioni di lavaggio** (soluzione fisiologica, spray di acqua termale o marina). Eviti l'utilizzo dello stesso beccuccio da parte di tutta la famiglia.
- eviti il fumo attivo e passivo;
- dorma con la testa sollevata per migliorare il flusso d'aria attraverso le narici ostruite e dorma a sufficienza;
- se necessario, protegga con una crema la cute del labbro superiore e delle narici poiché soffiarsi il naso ripetutamente tende ad irritare la cute;
- eviti i condizionatori che deumidificano l'aria e seccano la mucosa nasale, la temperatura ambiente ideale è di circa 18-20°C;
- assicuri la regolare ventilazione delle stanze.

COSA FARE IN CASO DI FEBBRE:

La normale temperatura corporea varia da soggetto a soggetto ed è compresa tra 36,5°C e 37,5°C. Un aumento della temperatura al di sopra di 38°C può essere considerato febbre.

Se gli effetti della febbre diventano troppo fastidiosi, può prendere questo medicinale che contiene paracetamolo, rispettando la posologia indicata.

Ricordi di bere spesso, per prevenire il rischio di disidratazione.

Con questo medicinale, la febbre dovrebbe diminuire rapidamente. Tuttavia:

- se compaiono altri segni inusuali,
- se la febbre persiste per più di 3 giorni o peggiora,
- se la cefalea peggiora o in caso di vomito,

CONSULTI IMMEDIATAMENTE IL MEDICO.

COSA FARE IN CASO DI DOLORE:

L'intensità della percezione del dolore e la capacità di sopportazione variano da soggetto a soggetto.

- Se non vi è alcun miglioramento dopo 5 giorni di trattamento,
- se il dolore è intenso, inaspettato e si manifesta improvvisamente (in particolare un dolore toracico significativo) e/o, al contrario, si manifesta regolarmente,
- se il dolore è accompagnato da altri segni, quali un senso di malessere generalizzato, febbre, gonfiore insolito nell'area dolente, riduzione della forza di un arto,
- se il dolore la sveglia durante la notte,

CONSULTI IMMEDIATAMENTE IL MEDICO.